

- C. lippincottianus*, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, Rep. foss. Vertebr. Colorado. — Annual Report by
Hayden, Washington. 1874.
- C. osorum*, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, l. c. 1874.
- C. hartshornianus*, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, l. c. 1874.
- C. gregarius*, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, l. c. 1874.
- C. saevus*, Leidy. Pliocän von Niobrara und New-Mexico.
Leidy, Ext. mamm. f. Dak. Nebr. 1869. Pl. I. fig. 9.
Cope, Säugeth. im Pliocän von New-Mexico. — Wheeler's
Report. 1875.

(Fortsetzung folgt.)

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

711. *Rhytidosomus* Stephens.

rhytis Runzel, soma Leib, Körper.

- 1) *globulus* Herbst. 3394.
notatus Meg. — Augsburg s.; München; Passau; Aschaffen-
burg s. s.

712. *Poophagus* Schönherr.

poë Gras, phago ich esse.

- 1) *Sisymbrii* Fabr. 3395.
Allgäu, Stark; München; Regensburg s.; Eichstädt; Nürn-
berg; Erlangen, Schlemmer; Hanau, Notar v. Sonn.; Giessen,
Laubenheimer.

713. *Tapinotus* Schönherr.

tapeinos niedrig, notos Rücken.

- 1) *sellatus* Fabr. 3396.
ephippiger Schönh. — Lysimachiae Oliv. — Augsburg ein
Stück, Prof. Kuhn; Freising ein Stück, Attachinger Au am 21.

Mai; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; in den Blüten von *Lysimachia vulgaris*, Fasanerie-See; Giesen einzeln, *Laubenhaimer*.

714. *Eubrychius* Thomson.

eubrychios untergetaucht.

Litodactylus Redtenbacher.

- 1) *velatus* Beck. 3397.
 aquaticus Thomson. — Myriophylli Steph. — natator Kirby in litt. — Zusmarshausen: Nürnberg, am Weiher bei Unter-Burg ein Stück im Grase gekötschert, August; Frankfurt ein Stück, Dr. M. Schmidt.

715. *Litodactylus* Redtenbacher.

litos dünn, dactylos Finger.

- 1) *leucogaster* Marsh. 3398.
 Myriophylli Gylh. — gonymelas Kirby in litt. — München; Regensburg n. s.; Marburg, Decan Scr.

716. *Phytobius* Schönherr.

phyton Pflanze, bioo ich lebe.

- 1) *granatus* Gylh. 3399.
 Augsburg.
- 2) *notula* Germ. 3400.
 canaliculatus Fährs. — Larve Perris. Mem. Ac. Lyon. 1851. p. 102. — Augsburg ein Stück, Schwimmschule, Juli; München; Freising; Regensburg n. s.
- 3) *quadrinodosus* Gylh. 3401.
 mucronulatus Germ. — Augsburg; München.
- 4) *Comari* Herbst. 3402.
 sulcatus Sturm. — Nürnberg, Dutzendteich, August; Aschaffenburg s.
- 5) *quadrıtuberculatus* Fabr. 3403.
 quadricornis Payk. — quadridentatus Steph. — Ribis Stroem. — Zusmarshausen; Augsburg h., Rosenauerg in Weidenmoder, Oktober; Leitershofen in Moos, November; München; Freising h. s., in Isargenist, März, April; Plantagenwald, April; Moosburg, Notar v. Sonn.; Nürnberg, Herrenhütte, August; Aschaffenburg s.
- 6) *quadricornis* Gylh. 3404.
 quadrıtuberculatus var. Herbst. — Augsburg ein Stück; München; Nürnberg, Dutzendteich, August. — *Phytobius denticolis* Schh. von v. Heiden bei Frankfurt zwei Stück gefunden.

717. *Rhinoncus* Schönherr.

rhin Nase, onkos Anschwellung.

- 1) *topiarius* Germ. 3405.
coarctatus Jacq. Duv. — tessellatus Sturm. — Um Heidelberg von Senator v. Heyden einmal gefunden.
- 2) *Castor* Fabr. 3406.
fructiculosus Herbst. — seniculus Grav. — pericarpus var. Linn. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München; Freising; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor Hoffmann; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Frankfurt n. s., Decan Scr.
- 3) *bruchoides* Herbst. 3407.
carinatus Sturm. — Augsburg ein Stück; Freising ein Stück auf den Wiesen bei Vötting gestreift am 20. August; in Isargenist, März; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, Schlemmer; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiet, im Süden desselben häufiger.
- 4) *inconspectus* Herbst. 3408.
accipitrinus Reich. — canaliculatus Steph. — crassus Marsh. — suturalis Oliv. — Augsburg s., bei Leitershofen Juli; München; Freising n. s.; in Isargenist, November; Passau; Regensburg s.; Nürnberg s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Decan Scr.; Salzhausen, Senator v. Heyden.
- 5) *pericarpus* Linn. 3409.
gramineus Fabr. — Persicariae Meg. — Spartii Steph. — Rumicium Kirby in litt. — Ueberall häufig, das ganze Jahr hindurch, überwintert in Moos.
- 6) *perpendicularis* Reich. 3410.
subfasciatus Gylh. — guttalis Grav. — erythrocneme Beck. — tibialis Steph. — Augsburg h., bei Lechhausen, Mai, Deuringen in Moos, April; München; Freising h., Weihenstephan, Wiesenwald, Wald bei Wippenhausen, Mai bis August, in Isargenist, November; Passau; Regensburg n. g.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg, Dutzendteich, August; Erlangen; Aschaffenburg n. h.; Hessen, durch das ganze Gebiet verbreitet, aber nicht häufig.
- 7) *albicinctus* Gylh. 3411.
canescens Sturm. — tibialis Dej. — München; Nürnberg, ein Stück; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg, Professor Oechsner.

(Fortsetzung folgt.)

 Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)