

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

616. *Hapalus Fabricius.*

hapalos weichhaarig, weich.

1) *bimaculatus* Linné. 2901.

Larve Géné. Ann. Sc. nat. XXIII. p. 138. — Moosburg h.,
Notar von Sonn., im ersten Frühjahr auf *Allyssum calycinum*.

617. *Sitaris Latreille.*

Sitaris Name eines Vogels.

1) *muralis* Forst. 2902.

humeralis Fabr. — attenuata Fourcr. — Larve Muls. Vesic.
p. 193. f. 27—28. — Mannheim in einem Bienenneste in Mehr-
zahl, 1829, Vogt; Speier in Hummelnestern Linz; Frankfurt ein
Stück auf dem Götheplatz, Dr. Moritz Schmidt, Strasse nach Wies-
baden, Prof. Dr. Kirschbaum. Im Herbst 1874 wurden auf der Alt-
gasse zu Frankfurt beim Abreißen eines alten Hauses 75 Männ-
chen von Schulfungen gefangen, von denen 32 in meine Hände
gelangten, von Heyden. Vogt fand in einem Bienennest hinter
dem Fensterladen nur Weibchen, wenigstens gehören alle Exem-
plare, die mein Vater erhielt zu diesem Geschlecht, von Heyden.

Die Larven von *Sitaris* entwickeln sich gerade so wie die
Larven von *Meloë*.

In Baiern finden sich 16 Arten. 3 Varietäten, 812 Arten sind
bis jetzt beschrieben.

Familie XLIX. OEDEMERIDAE.

618. *Calopus Fabricius.*

Kalos schön, puss. Fuss.

1) *serraticornis* Linné. 2903.

Larve Gyllh. Ins. Suec. II. p. 513. — Kawall. Stett. Zeitg.
1855 p. 228. — Zusmarshausen; Augsburg s., an den Mauern an
der Bahnhofstrasse, Schweiger; München, Schleissheim, Notar
von Sonn.; Dinkelsbühl n. s., Mai, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Er-
langen; Wunsiedel, Rector Buchner.

Sparedrus testaceus Andersch kommt nicht bei Passau vor.

619. *Ditylus* Fischer.

ditylos zweihöckerig.

1) *laevis* Fabr.

2904.

heloledioides Fisch. — unicolor Eschsch. — Larve Kole-nati. Bull. Mosc. 1847. I. p. 137. t. 4. f. 1–20. — Wunsiedel in grösserer Anzahl, Lang, Forstbediensteter. Kronach in Oberfranken, Oberförster Lang; Passau und München, Prof. Dr. Rosenhauer.

620. *Nacerdes* Schmidt.1) *melanura* Linné.

2905.

♂ analis Oliv. — notata Fabr. — nigripes Fabr. — rufa Brulli. — praeusta Melsh. — testacea Fourcr. — acuta Marsh. — lepturoides Thunbg. — erminea Germ. — apicalis Say. — Zusmarshausen; München; Regensburg n. g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg g.

621. *Asclera* Schmidt.

a nicht skleros hart.

Ischnomera Stephens.

ischnos schlank, meros Schienbein.

1) *sanguinicollis* Fabr.

2906.

flavicolis Panz. — Augsburg n. s., Göggingen, Mai; München Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising n. s., Wald bei Thalhausen, Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Mai; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. Langhans; Aschbach und Ebrachs. auf Blüten von Salix aurita und Spiraea Aruncus; Unken s. h., Rösch; Aschaffenburg s.; Frankfurter Wald von Heyden.

2) *coerulea* Linné.

2907.

coerulescens Fabr. — cyanea Fabr. — seladonia Fabr. — nigripes Oliv. — unicolor Melsh. — Larve Heeger, Stzgb. Wien Ac. XI. 1853. p. 932. t. 3. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München zwischen Harlaching und Grünwald durch Abklopfen, Juni, Dr. Kr.; Freising; Passau; Regensburg n. s.; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; in Menge im ersten Frühjahr aus Frankfurter Waldholz gezogen, von Heyden.

622. *Dryops* Fabricius.

Oncomera Stephens.

onkos Geschwulst, meros Schiene.

1) *femorata* Fabr.

2908.

♀ calopoides Germ. — femoralis Oliv. — simplex Donovan.

podagrariae Stev. — Streitberg, Ein ♀ am ersten Juli 1854 von Dr. Weber Nachts ein Uhr an der Wand im Hausplatze kriechend gefunden; Alsbacher Schloss in der Bergstrasse ein Stück, auf Epheu. (Decan Scr.)

623. *Oedemera* Olivier.

oideo anschwellen, meros Schiene.

1) *Podagrariae* Linné. 2909.

flavescens Rossi. — fulva Fourcr. — ♀ melanocephala Panz, — simplex Donov. — Zusmarshausen; Augsburg n. h.; München; zwischen Maisach und dem Ammersee durch Streifen, Juli, Dr. Kr.; Freising n. s., Weihestephan auf Galium verum, Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald h. auf Blüten: Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg h.; Soden h., Decan Scr.

2) *flavescens* Linné. 2910.

femorata Scop. — ♀ simplex Fabr. — pratterana Schrank. — Augsburg g.; München, Pullach, Juni, zwischen Tölz, Wolfrathshausen und Schäftlarn, Juni Dr. Kr.; Freising g., Weihestephan, Wald bei Wippenhausen Mai bis Juli; Moosburg Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Bamberg, Prof. Hoffmann; Ober-Lais einzeln, Decan Scr.

3) *subulata* Oliv. 2911.

♂ femorata Panz. — ♀ phthisica Scop. — marginata Fabr. — discoidalis Latr. — stenoptera Falderm. — Augsburg; München, Pullach, Juni, bei Harlaching auf Blüten, Juli, Geiseltaig, Juni, Thalkirchen, Juni, Dr. Kr.; Passau; Regensburg s.; Frankfurt und Falkenstein im Taunus n. s., von Heyden.

4) *coerulea* Linné. 2912.

nobilis Scop. — ceramboides Forst. — Moosburg; Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Aschaffenburg s.

5) *tristis* Schmidt. 2913.

montana Heyden in litt. — Allgäu Obergemeter Stark. Im hohen Vogelsberg einige Stücke, Decan Scr.

6) *flavipes* Fabr. 2914.

♂ clavipes Panz. — nasuta Steph. — Augsburg; München; Passau, Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald g.; Bamberg Professor Hoffmann; Frankfurt, von Heyden; Darmstadt, Dr. Nebel; in der Bergstrasse. Decan Scr.

7) *virescens* Linné. 2915.

concolor Sturm. — grisescens Meg. — lurida Mannerh. — striata Herbst. — Augsburg; München, Pullach, Juni, Hessellohe

auf *Caltha palustris*, Mai, Maria Einsiedl durch Abklopfen, Juni, bei Bogenhausen durch Streifen, Juli, Thalkirchen, Juni, Dr. Kr.; Freising; Moosburg Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald, Aschaffenburg h.

8) *lurida* Marsh. 2916.

splendens Ziegl. — Augsburg h; München, Bogenhausen durch Streifen, Juni, Nymphenburg durch Streifen, Juli, zwischen Ebenhausen und Wolfrathshausen durch Streifen, August, Dr. Kr.; Freising h., Wiesenwald, September; Landshut Notar von Sonn.; Regensburg g.; Nürnberg g., auf niederen Pflanzen gekötschert; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor Hoffmann; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

624. *Anoncodes* Schmidt.

1) *adusta* Panz. 2917.

♀ collaris Panz. — ♀ dorsalis Villa. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Teichenbeize durch Abklopfen, Juli, zwischen Nymphenburg und Hartmannshofen auf einer Dolde, Juli, Bogenhausen durch Streifen, Juni, an einer Bretterwand, Mai, Dr. Kr.; Freising h., Weihestephan, Mai bis Juli, Pförer Au, auf niederen Pflanzen gekötschert; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. g.; Nürnberg n. s., an morschen Eichenpfählen.

2) *rufiventris* Scop. 2918.

melanocephala Fabr. — affinis Dej. — bipartita Schrank. — dorsalis Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg s.; Allgäu, Obergeometer Stark; München, Geiseltasteig durch Abstreifen, Juli, Pullach auf Blüten, Juni, Maria Einsiedl durch Abklopfen, Juni, Sendling, Juni, Nymphenburg Juli, zwischen Ebenhausen und Wohlfrathshausen geschöpft, August, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. g.; Erlangen; Frankfurt, zwei Männchen, Senator von Heyden.

3) *ustulata* Fabr. 2919.

♀ melanura Fabr. — ♀ rufa Fisch. — ♀ scutellaris Waltl. — Zusmarshausen; Augsburg h., Spickel; München, bei den Ueberfällen, Juni, zwischen Maisach und dem Ammersee durch Streifen, Juli, Dr. Kr.; Ammerland, Juni; Freising h., Wiesen an der Münchner Strasse, Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg h. auf Wiesen, am Weiher bei Unter-Bürg; Erlangen; Steigerwald n. s. auf Blüten; Aschaffenburg s. s., bei der Bergmühle; Frankfurt, Senator v. Heyden. — var. opaca Gemminger. München.

4) *fulvicollis* Scop. 2920.

Augsburg ein Stück; Allgäu, Obergeometer Stark; München;

Tegernsee, August, September, Dr. Kr.; Moosburg, Notar von Sonn.; Unken, Gscheidlen.

5) *ruficollis* Fabr. 2921.

♂ coeruleescens Rossi. — München.

6) *viridipes* Schmidt. 2922.

dispar Sturm. — thoracica Dalm. — ruficollis Villa. — nigripes Ulrich. — sericea Falderm. — München.

625: *Chrysanthia* Schmidt.

chrysos Gold, anthos. Blüte.

1) *viridissima* Linné. 2923.

thalassina Fabr. — Larve Westw. Introd. I. 1839. p. 305. f. 35. nr. 8—11. — Augsburg n. h., Spickel, Juli; München, zwischen Hesselöhe und Pullach, geschöpft, Juli, Dr. Kr.; Schleissheim, Notar von Sonn.; Freising; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s.

2) *viridis* Schmidt. 2924.

viridissima Fabr. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Spickel, Leitershofen, Juli; München; Grünwald, August, beim Lettinger auf *Heracleum Sphondylium*, Juli, Fürstenwald, Juli, Weg zur Königsalpe auf einer Dolde, September Dr. Kr.; Schleissheim, Notar von Sonn.; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, Wiesenwald auf *Galium verum*, Juli; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen, Steigerwald; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan Scr.; Frankfurt, Senator von Heyden.

3) *varipes* Kiesw. 2925.

Kissingen s. h., Rösch.

626. *Mycterus* Clairville.

mycter Nase.

1) *curculionoides* Fabr. 2926.

griseus Clairv. — rhinomacer Payk. — ♀ pulverulentus Chevrolat. — München; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald n. s., auf Blüten; Aschaffenburg n. s., auf *Spiraea*, Decan Scr.

2) *umbellatarum* Fabr. 2927.

flavicornis Illig. — ruficornis Muls et God. — München.

In Baiern finden sich 25 Arten und eine Varietät, 208 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie L. CURCULIONIDAE.

A. Otiorhynchini.

627. *Mylacus Schönherr.*

mylax Mühlstein.

1) ***rotundatus* Fabr.** 2928.

ovatus Oliv. (*Omius*) — *puberulus* Steph. — München; Hessen im ganzen Gebiete an manchen Orten z. B. bei Harzheim in Rheinhessen n. s. Decan *Scr.*

628. *Otiorhynchus Germar.*

Otiorhynchus, rhinchos Rüssel, (wegen des an der Fühlerwurzel lappig erweiterten Rüssels).

Otiorhynchus Germar.

A. Dodecastichus Strl.

1) ***geniculatus* Germ.** 2929.

egenus Sturm. — *irroratus* Ziegl. — *pustulosus* Ulrich in litt. — Augsburg h., Spickel, Mai und Juni geköschtert, Februar daselbst in Moos gefunden; München, bei Pullach und Harlaching, Juni, zwischen Grünwald und der Mengerschwaige durch Abklopfen von Föhren, August, Dr. *Kr.*; Freising n. s. Attachingen Au, Mai und Juni von Gesträuch geklopft; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg (?).

B. Otiorhynchus. Germ.

2) ***sensitivus* Scopoli.** 2930.

planatus Herbst. — Tegernsee, Juni bis Oktober, im schwarzen Tänner auf Fichten, August Dr. *Kr.*

3) ***fuscipes* Oliv.** 2931.

pedemontanus Dej. — *tenebricosus* Sturm. — *haematopus* Meg. in litt. — Augsburg s.; München; Allgäu h., Obergemeister *Stark.*

4) *tenebricosus* Herbst. 2932.

♂ ater Gyll. — ♂ niger Marsh — ♀ morio Payk. — clavipes Oliv. — maritimus var. Donovan. — Augsburg s.; München, bei Harlaching, Mai, Tegernsee h., Juni bis August, Königsalpe, Juni, Gündelalpe August, Dr. Kr.; Allgäu h., Obergeometer Stark; Passau; Steingaden, Schrank; Fränkische Schweiz; Wimpfen einmal, Decan Scr.

5) *armadillo* Rossi. 2933.

nigrita Rossi. — orbicularis Oliv. — sulphurifer Herbst. — Augsburg s.; München, Passau.

6) *scabripennis* Gyll. 2934.

Augsburg ein Stück; Allgäu, Obergeometer Stark; auf dem Rochusberge bei Bingen vom Herrn Senator von Heyden ein Stück aufgefunden, Stein.

7) *multipunctatus* Fabr. 2935.

depressus Sturm. — ♀ silesiacus Meg. in litt. — Augsburg s.; München; bei den Kalköfen oberhalb Thalkirchen, Juni, bei Maria Einsiedl durch Abklopfen, Juli, zwischen Grünwald und der Menterschwaige, August, im schwarzen Tänner auf Nadelholz, August, auf dem Pfliegeleck, Mai, Dr. Kr.; Passau; Erlangen. — var. irritans Herbst. — adpersus Dahl. — maculatus Dahl. — Augsburg s.; München bei Thalkirchen, Mai, durch Abklopfen der Föhren zwischen Grünwald und der Menterschwaige, August, Dr. Kr.

8) *niger* Fabr. 2936.

ater Herbst. — multipunctatus Oliv. — scrobiculatus Gyllh. Larve Ratzeburg Forstins. 1837. s. p. 116. t. 4. f. 8. — Augsburg n. s.; München; Allgäu; Passau; Regensburg n. s.; Burghausen und Gern Schrank; Nürnberg n. s.; Erlangen; Weiden h. an Fichtentrieben, Schmidt; von Herrn Professor Döbner auf der Rhön gefunden, auch wohl auf dem Vogelsberge vorkommend (Sc.). var. coecus Germ. — Allgäu, Obergeometer Stark. var. villosopunctatus Gyllh. — Argus Duft. — München; auf dem Gipfel des Schildsteines bei Kreuth, Juni; Tegernsee im schwarzen Tänner auf Fichten h. August auf der Neureuth und Gündelalpe h. August, Dr. Kr.

Die Larven leben in der Erde von Fichtenwurzeln, und verpuppen sich daneben in kleinen Erdhöhlen. Die Käfer fressen dicht über den Wurzelknoten und später überall an der Rinde der jungen Pflanzen. Man sammle die Käfer im Herbste und Frühjahr von den jungen Pflanzen.

9) *morio* Fabr. 2937.

unicolor Herbst. — tenebricosus Oliv. — pimelioides Ziegl. — Augsburg s.; München, Juli, Tegernsee im Lerchenwald, April

bis August, Dietramszell, August. Dr. *Kr.*; Passau; Erlangen. var. *ebeninus* Gylh. — Augsburg s.; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Erlangen. — var. *memnonius* Gylh. — Erlangen.

10) ***orbicularis*** *Herbst.* 2938.

catenulatus Panz. — *maurus* Schrank. — *tenebricosus* Oliv. — Tegernsee, *Schrank*; Aschaffenburg s.

11) ***raucus*** *Fabr.* 2939.

arenarius *Herbst.* — *luctuosus* Latr. — *tristis* *Bonsd.* — Augsburg s.; München, Geiseltasteig, Juli, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Marzlinger Wiesen auf Gesträuch, April, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Hessen h. (*Decan Scr.*)

Der Käfer ist zuweilen verderblich für die Knospen der Obstbäume und des Weinstockes.

12) ***porcatus*** *Herbst.* 2940.

costatus *Fabr.* — *sexcostatus* Latr. — *senex* Oliv. — Augsburg h., Schwimmschule, Mai, Juni; München, Pullach, Juni, Ertlsgraben unter Steinen, Juni, Tegernsee, an der Weissach unter einem Brett, August Dr. *Kr.*; Freising h., Wald bei Thalhausen von Bäumen geklopft, Lohmühle, Mai, Juni, in Isargenist, April und November; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall h.; Allgäu *Stark.*

13) ***septenterionis*** *Herbst.* 2941.

raucus *Herbst.* — *echinatus* *Herbst.* — *setosus* *Fabr.* — *gemellatus* *Beck.* — *griseopunctatus* *Degeer.* — *multicolor* *Gmel.* — *scaber* *Bonsd.* — Zusmarshausen; Augsburg h., Deuringen, Mai; München, Geiseltasteig, Juli, Tegernsee im Lerchenwald, September, Dr. *Kr.*; Freising h., Wald bei Thalhausen in Moder, April, Wiesenwald, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s., Nürnberg n. s., Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald s. s., Aschaffenburg s. s. Allgäu, *Stark.*

14) ***uncinatus*** *Herm.* 2942.

Augsburg s., Wald bei Leitershofen in Moos ein Stück, November; Spickelwald in Moos 5 Stück Februar, zwei Stück Juni, an den Wänden des Wirthschaftsgebäudes; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Fränkische Schweiz n. s. hinter Felsen in Moos; bei Ortenberg von Dr. *Bose* einige Stücke aufgefunden.

15) ***singularis*** *Linné.* 2943.

picipes *Fabr.* — *granulatus* *Herbst.* — *squamiger* *Marsh.* — *asper* *Marsh.* — *notatus* *Bonsd.* — Zusmarshausen; Augsburg h.; Lechfeld bei Mering, Juni; München bei Maria Einsiedl, Juni, Tegernsee, Juni, im Lerchenwald, Juli, Dr. *Kr.*; Freising, Weihestephan, Wiesenwald, Plantagenwald April bis August, im Früh-

jahr unter Moos im Sommer auf Bäumen; Moosburg Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Gern und Steingaden, *Schrank*; Eichstädt; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald ziemlich h.; Würzburg; Aschaffenburg h.; Hessen allenthalben g.; var. *Chevroleti* Gylh. Einigermal bei Lorsch gefunden, Senator von *Heyden*.

Der Käfer frisst die Weinstockknospen aus, ist in Baumschulen den Pfropfreisern sehr schädlich.

16) *pupillatus* Gylh. 2944.

Allgäu, Obergemeister *Stark*. — var. *centropunctatus* Ziegl. — Passau.

17) *gemmatus* Fabr. 2945.

religiosus *Schrank*. — Zusmarshausen; Augsburg; Unken; *Gscheidlen*; München, bei den Kalköfen oberhalb Thalkirchen, bei Grünwald und Pullach, Mai, Juni, bei Miesbach, August, Tegernsee, August, Neureuth und Gründelalpe, August, Dr. *Kr.* Beuerberg am Starnberger See; Passau; Regensburg (kaum hier H. Sch.).

Der Käfer kommt vielfältig auf der grossen Brennessel vor, *Schrank*.

var. *chlorophanus* Bohem. — München.

18) *lepidopterus* Fabr. 2946.

squamiger Fabr. — Augsburg am Lechablass ein Stück, Mai Allgäu h., Obergemeister *Stark*; München; auf der Neureuth und Gründelalpe auf Nadelholz und Rubus-Blüthen, August, Dr. *Kr.*; Passau, Erlangen.

19) *funicularis* Gylh. 2947.

infaustus Gyllh. — *asperatus* Dej. — *fagi* Meg. — Fraxini Germ. — Augsburg s.

20) *sulcatus* Fabr. 2948.

strictus Gmel. — *griseopunctatus* Degeer. — *apiculatus* Say. — Larve Westwood. Introd. 1839. I. p. 334. f. 41. (9–11). — Lucas Ann. Fr. 1869. p. 50. — Augsburg s.; München, Regensburg s.; Erlangen; Frankfurt einzeln gesammelt, *Stern* und Senator von *Heyden*.

Seine Larve soll an den Wurzeln von Saxifragen und Primeln leben, welche sie bis auf den Stamm abfrisst und tödtet, nach Westwood soll sie dem Weinstocke schaden. Sie ist 9 Millim. lang, fusslos, fast elliptisch, hinten etwas verschmälert, gekrümmt, gelblichweiss und rot behaart, mit fast halbkugeligem gelbem zurückziehbarem Kopfe.

21) *Ligustici* Linn. 2949.

Levistici Müll. — *Mülleri* Gmel. — *monopterus* Fourcr. —

Brucki Bach. — Zusmarshausen; Augsburg h., Lechfeld bei Mer-
 ing, Juni; München; bei Nymphenburg, Mai, Tegernsee, Juni,
 Dr. Kr.; Ammerland am Starnberger See, Juni; Freising h.,
 Weihestephan, Wiesenwald, Wald bei Thalhausen, April bis
 Juni, meistens auf der Erde uud und unter Steinen, Moosburg,
 Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg
 h.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald s.; Würzburg; Aschaf-
 fenburg s. h.; Hessen überall s. h.

Käfer und Larven sollen in Doldengewächsen leben und in
 deren Wurzeln so wie im Rosenmarke sehr schaden.

22) *rugifrons* Gylh. 2950.

Dillwyni Steph. — *rugicollis* Steph. — Augsburg s.; Allgäu,
 Obergemeter *Stark*; Erlangen, *Schlemmer*; Fränkische Schweiz
 n. s. hinter Felsen in Moos.

23) *pinastri* Herbst. 2951.

pertusus Ziegl. — Augsburg s.; München, Geiseltasteig, Mai,
 bei den Kalköfen, oberhalb Thalkirchen, Juni, Dr. Kr.; Passau;
 Erlangen.

24) *ovatus* Linn. 2952.

Rosae Degeer. — *Scopoli* Gmel. — *rufipes* Scop. — Zusmars-
 hausen; Augsburg h.; München, im Isargenist von Bogenhausen,
 Mai, bei Pullach Juni, Nymphenburg Anfang September, Dr. Kr.;
 Freising s. h., Weihestephan, April bis Juni; Moosburg, Notar
 von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg g.,
 Wald bei der Herrnhütte in Moos August, in Pegnitzgenist, Au-
 gust; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h.;
 Hessen, überall s. h.

C. *Tournieria* Stierl.

25) *fullo* Schrank. 2953.

zebra Fabr. — *carinatus* Payk. — Man findet ihn gewöhnlich
 an der Erde, *Schrank*; Nürnberg; Erlangen.

Otiorehynchus sulphurifer Fabr. bei Zusmarshausen nach Beck.
Otiorehynchus rugosus Hummel kommt sicher bei Passau nicht vor.

629. *Peritelus* Germar.

perium, herum, telos Ende.

1) *hirticornis* Herbst. (*Otiorehynchus*). 2954.

chrysoleucus Stenz. — *simo* Oliv. — *variegatus* Bohem. —
 ♀ *depubes* Boh. — Augsburg s.; München; Freising n. h., Weihestephan,
 von Bäumen geklopft, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*;
 Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.

2) *griseus* Oliv. 2955.

sphaeroides Germ. — hemisphaericus Sturm. — dissimilis Sturm. — inquinatus Ill. in litt. — Augsburg n. h. Wolfratshausen, Mai, Juni; München; Passau; Regensburg g.; Aschaffenburg n. h.; Hessen, im Süden des Gebietes häufig, im Norden ist mir kein Fundort bekannt (Decan Scr.)

Der Käfer frisst die Knospen von Acer (Ahorn), Vitis (Weinstock) und Cedrus (Ceder), von Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen und Wallnussbäumen, zumal auch deren Pflöpfreisern.

3) *leucogrammus* Germ. 2956.

albolineatus Dej. — albovittatus Dahl. — fuscipes Meg. — lanuginosus Creutz. — sublineatus Gyssel. — lithargyreus Gyssel. — Larve Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien 1861. p. 169. — Augsburg s.

630. *Omius* Schoenherr.

omios mit breiten Schultern.

1) *concinuus* Boh. 2957.

oblongus Boh. — parvulus Boh. — sericeus Bohem. — mandibularis Chevrol. — Marqueti Gautier. — Raymondi Gautier. — Augsburg s.; Hexenagger bei Regensburg unter *Formica rufa*, von Weidenbach; Seligenstadt ein einzelnes Exemplar Decan Scr.

2) *mollinus* Schh. 2958.

Bohemanni Zett. — Frankfurt ein Exemplar, Dr. M. Schmidt.

3) *forticornis* Bohem. 2959.

gracilipes Bohem. — rugicollis Bohem. — validicornis Märkel. — Passau; Fränkische Schweiz h.; Seligenstadt s.; Ober Lais und Ortenberg n. s., Decan Scr.

631. *Barypithes* Jacquelin Duval.

barys schwer, peito ich bewege.

Barypeithes Jacq. Dw.

1) *Chevrolati* Bohem. 2960.

♀ ruficollis Bohem. — ♀ subnitidus Bohem. — München.

2) *montanus* Chevrol. 2961.

Darmstadt ein, Oberstlieutenant Klingelhöffer; Rippoldsau im Schwarzwald, von Heyden.

- 3) **araneiformis** Schrank. 2962.
 brunripes Oliv. — ♂ ebeninus Boh. — gracilis Beck. — piceus Marsh. — Augsburg s.; unter Ameisen; München; Passau; Aschaffenburg n. h.; Hessen im ganzen Gebiete n. s.
- 4) **mollicomus** Ahrens. 2963.
 holosericeus Fabr. — ruficollis Fabr. — punctirostris Bohem. — Augsburg s.; München; Passau; Regensburg n. g.; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.
- 5) **tenex** Boh. 2964.
 parvulus Ulrich in litt. — Seligenstadt, ein Exemplar Decan Scr.; im Frankfurter Wald und im Taunus n. s., von Heyden.

632. **Platytarsus** Schoenherr.

platys breit, tarsos Tarse.

Brachysomus Schoenherr.

brachys kurz, soma Leib, Körper.

- 1) **setiger** Gylh. 2965.
 ♀ pruinosis Bohem. — Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner.
- 2) **villosulus** Germ. 2966.
 München; Passau.
- 3) **echinatus** Bonsdorff. 2967.
 hirsutulus Fabr. — hispidulus Herbst. — scabriculus Herbst. — scaber Müll. — Zusmarshausen; Augsburg h., Leitershofen, Spickel, in Moos, April; München, bei Pullach durch Streifen; Juni, Dr. Kr.; Freising g., Weihenstephan, Attachinger Au, Wald bei Wippenhausen und bei Thalhausen in Moos April, von Bäumen geklopft, Juni; Passau; Regensburg g.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Eichstädt; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg s.; Hessen, überall im Gebiete aber nicht h.
- 4) **subnudus** Seidl. 2968.
 Freising n. s. Weihenstephan Mai unter abgefallenen Blättern und Steinen, im Juni von Gesträuch abgeklopft.

633. **Trachyploeus** Germar.

trachys rauh, phloios Rinde.

- 1) **alternans** Gylh. 2969.
 scaber Redt. — Augsburg am 12. Mai 1867 ein Stück bei

Deuringen; Saline Wisselsheim in Oberhessen zwei Stück, Frankfurt ein Exemplar, von *Heyden*.

2) ***spinimanus* Germ.** 2970.

lanuginosus Gylh. — echinatus Dej. — scabriculus Oliv. — simplex Sturm. — Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Friedberg von *Heyden*.

3) ***digitalis* Gylh.** 2971.

Regensburg s., bei Harxheim in Rheinhesen einmal in Mehrzahl gefunden, Decan *Scr.*

4) ***scabriculus* Linné.** 2972.

♂ *Erinaceus* Reden. — maculatus Schönh. in litt. — scaber Schoenh. — *Viverra* Herbst. — occultus Chevrol. in litt. — *digitalis* Steph. — ♂ *setarius* Gylh. — ♀ *spinimanus* Gylh. — Larve Schilling Arb. schles. Ges. 1828 p 73. — Zusmarshausen; Augsburg n. h.; München, bei Nymphenburg, Juni, bei Harlaching, Juni, aus Isargeuist von Bogenhausen, August, Dr. *Kr.*; Freising, Giggenhausen in einem Kornfelde, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg n. s., Dutzendteich und Wäldchen bei der Herrenhütte in Sand, August; Eichstädt; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Hessen im ganzen Gebiete n. s.

5) ***ventricosus* Germ.** 2973.

tigrinus Mag. — Aschaffenburg n. s. (?).

6) ***scaber* Linné.** 2974.

scabriculus Gylh. — squamosus Gylh. — tessellatus Marsh. — muralis Reich in litt. — bifoveolatus Beck. — septentrionis Thoms. — confinis Steph. — nigricans Steph. — Augsburg, München; Moosburg Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h., Dutzendteich auf Sand unter Moos, August; Manghofer Weiher, September; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt, Nauheim und Königstein n. s., von *Heyden*.

7) ***aristatus* Gylh.** 2975.

asphaltinus Gylh. — stipulatus Germ. — setosus Marsh. — hispidulus Steph. — Augsburg; München, aus Isargenist von Bogenhausen, August, Dr. *Kr.*; einige Stücke bei Seligenstadt; Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden*.

8) ***squamulatus* Oliv.** 2976.

Augsburg; München; Freising n. h., Wiesenwald August, in Isargeniste, September; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg n. h.; Erlangen; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Offenbach, Frankfurt und Bingen, einzeln, von *Heyden*.

634. *Phyllobius* Germar.

phyllon Blatt, bioo ich lebe.

1) *glaucus* Scopoli. 2977.

calcaratus Fabr. — caesius Marsh. — aeruginosus Kirby in litt. — Augsburg n. s.; Allgäu, Obergeometer Stark: München, im Ertlsgarten, Mai, bei Thalkirchen, Mai, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg h.; Hessen im ganzen Gebiete n. s. (*Phyllobius glaucus*, *calcaratus* und *alneti* sind nicht spezifisch zu trennen, ebenso *pomaceus* und *verecundus*, von Heyden.)

2) *alneti* Fabr. 2978.

Piri Gylh. — prasinus Oliv. — conides Marsh. — angustatus Kirby in litt. — Zusmarshausen; Augsburg, Gscheidlen; München Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Aschaffenburg; Frankfurt an Urtica häufig beobachtet, von Heyden.

Häufig auf Waldbäumen, namentlich auf Erlen; auch den Obstbäumen schädlich (Lennis.).

3) *pomaceus* Gylh. 2979.

verecundus Boh. — München.

4) *psittacinus* Germ. 2980.

Augsburg s.; München; Freising s., Marzlinger Wiesen Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. h.

5) *pineti* Redtenb. 2981.

Ein Exemplar bei Marburg gefunden (Decan Scr.) (Fragliche Art, von Heyden).

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)