

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

- 7) **corruscus** Germ. 3046.
herbeus Gylh. — sericatus Dahl. — sericeus Ulrich. — Augsburg, Professor *Petry*; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.
- 8) **flavovirens** Gylh. 3047.
sericeus Herbst. — Augsburg, Professor *Petry*; München; (Ist var. von *impressifrons* Gyllh., von *Heyden*).
- 9) **cervinus** Linn. 3048.
Iris Fabr. — messor Herbst. — Larve Bouché Stett. Zeit. 1847. p. 165. — Ueberall h., besonders an Saalweiden.
- 10) **chrysomela** Oliv. 3049.
pulchellus Steph. — sericeus Steph. — Nürnberg n. s. s.; Aschaffenburg s.; Hessen s. (Fraglich ob richtig bestimmt, von *Heyden*.)
- 11) **confluens** Steph. 3050.
amaurus Steph. — chrysomela Gylh. — perplexus Gylh. — Bei Frankfurt und Mombach von v. *Heyden*, Ober-Lais von Herrn Decan *Scr.* in Mehrzahl gesammelt.
- 12) **sparsus** Gylh. 3051.
subundatus Peiroleri in litt. — Bei Frankfurt von v. *Heyden* zwei Stück aufgefunden, von Stud. *Weis* bei Darmstadt in der Fasanerie einmal in Mehrzahl von Eichen geklopft.
- 13) **sericeus** Schaller. 3052.
formosus Mayer. — smaragdinus Meg. — speciosus Steph. — splendidus Herbst. — squamosus Knoch in litt. — ♂ malachiticus Ulrich. — ♀ auratus Ulrich. — Ueberall h. auf Obstbäumen Mai—Juli.
- 14) **micans** Fabr. 3053.
argentatus Fourcr. — Pomonae Ulrich. — Pyri Linné. — Zusmarshausen; Augsburg h., München, bei Grünwald Mai, bei Harlaching Juni, Dr. *Kr.*; Freising, Wald bei Thalhausen auf Bäumen, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Rothenburg; Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg h., Hessen g., besonders auf Hainbuchen. An Obstbäumen und Haseln häufig und schädlich (Leunis.).

- 15) **Picus** Fabr. 3054.
Erlangen.
- 16) **virens** Sturm. 3055.
Passau (als *virescens* Sturm); Nürnberg *Sturm*. (fragliche Art, von *Heyden*.)

648. **Scythropus** Schönherr.

skythropus mürrisch.

- 1) **Mustela** Herbst. 3056.
villosulus Herbst. — Augsburg n. h.; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg h.; Hessen im ganzen Gebiete, manchmal an jungen Kiefertrieben n. s.

649. **Thylacites** Germar.

thylakos Sack, Beutel.

- 1) **pilosus** Fabr. 3057.
licinus Herbst. — *pilosulus* Herbst. — Moosburg, Notar von *Sonn.* (1871); — Passau.

650. **Tanymecus** Schönherr.

tanyo ich breite aus, mycos Länge.

- 1) **palliatius** Fabr. 3058.
canescens Herbst. — *diffinis* Marsh. — *glis* Rosi (?) — *graminicola* Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; Allgäu Obergeometer *Stark*; München, bei Maria Einsiedl durch Streifen, Juni, bei Lochhausen, Juni, in den Isarauen durch Schütteln, besonders der Weiden und Pappeln, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s. Dürreneck, Juni, in Isargenist, April; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall g.

651. **Chlorophanus** Germar.

chloros grün, phanos glänzend, strahlend.

- 1) **viridis** Linn. 3059.
brevicollis Gylh. — *inermis* Gylh. — *flavocinctus* Degeer. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., auf Weiden; München bei der Bogenhauser Brücke und bei Maria Einsiedl durch Abklopfen der Weiden, Juni bis September, Dr. *Kr.*; Freising n. s. Weihenstephan, Pförrer Au, Juni, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. an Weiden; Aschaffenburg s. h.; bei Seligenstadt h. am Mainufer an Weiden.

- 2) ***pollinosus* Fabr.** 3060.

prasinus Sturm. — Augsburg; München; in den Isarauen durch Schütteln der Weiden und Pappeln, Juni, bei Maria Einsiedl, Juni, Dr. *Kr.*; Freising, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; ein Exemplar bei Crumstadt gefunden; Frankfurt, von *Heyden*.

- 3) ***salicicola* Germ.** 3061.

Augsburg n. s. s., Professor *Kuhn*; München, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Aschaffenburg h.; von v. *Heyden* bei Mombach an Weiden gesammelt; Mainz (Dr. *Zitz*).

- 4) ***graminicola* Schh.** 3062.

festivus Bess. — *flavescens* Herbst. — *pollinosus* Oliv. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; bei Mainz von v. *Heyden* gefunden.

D. *Byrsopsini*.

Minyops costalis Gylh. kommt sicher bei Passau nicht vor.

652. *Gronops* Schönherr.

gronos ausgehöhlt, *ops* Gesicht.

- 1) ***lunata* Fabr.** 3063.

elevata Fabr. — *amputata* Oliv. — *costata* Gylh. — *percussor* Herbst. — Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Aschaffenburg s. s. nur einige Male gehascht, einmal bei Seligenstadt von Herrn Decan *Scr.*, einigemal bei Frankfurt von v. *Heyden* aufgefunden.

E. *Rhyparosomini*.

653. *Orthochaetes* Germar.

orthos gerade, *chaite* Mähne.

- 1) ***setiger* Beck.** 3064.

setosus Sturm. — Einige Stücke bei Seligenstadt unter Waldreben, (*Clematis Vitalba*) von Herrn Decan *Scr.*, bei Soden von Herrn Senator von *Heyden* aufgefunden.

F. Molytini.

654. *Liparus* Olivier.

liparos, dick, fett.

Molytes Schönherr.

molytes erschöpft, träge, moles Last.

1) *coronatus* Gonze.

3065.

germanus Fabr. — anglicanus Marsh. — teotonus Illig. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., im Frühjahr unter Steinen; München, bei den Kalköfen, oberhalb Thalkirchen, Juni, bei Nymphenburg, Juli, Dr. Kr.; Freising h., am Kirchhof, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Bamberg; Professor Hoffmann; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.; Hessen überall h.; die vogelberger Exemplare sind kleiner und auf den Flügeldecken ungefleckt, Decan Scr.

2) *germanus* Linn.

3066.

fuscocomaculatus Fabr. — tigris Goetze. — Zusmarshausen; Augsburg h., auf Pappeln vor dem Wertachbrücker Thor, Anfang Mai; Allgäu, Obergeometer Stark; München Bogenhausen Mai, Tegernsee, April bis August, Dr. Kr.; Freising, Moosburg, Notar von Sonn.; Passau, Nürnberg g.; Erlangen; Culmbach s. Schmidt; Fichtelgebirg; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. s.; einige Stücke bei Dietzenbach gefunden, Decan Scr.

3) *carinaerostris* Gyllh.

3067.

flavomaculatus Dahl. — laevirostris Gyllh. — glabrirostris Köst. — Kaufbeuren, Rector Buchner; Immenstadt, Obergeometer Stark; Benediktenwand Dr. Kummer.

4) *dirus* Herbst.

3068

glabratus Fabr. — reticulatopunctatus Sturm. — laevigatus Gyllh. — Regensburg s.; Erlangen, Schlemmer; Kissingen, Hope.

655. *Liosoma* Stephens.

leios glatt, soma Leib.

Leiosomus Schönherr.

1) *ovatum* Clairv.

3069.

crassicolle Dahl. — deflexum Panz. — limatum Duf. — neglectum Bremi. — punctatum Marsh. — Augsburg, am 20.

April 1866 zwei Stück von Weiden bei Lechhausen abgeklopft; Allgäu, Obergeometer *Stark*; von Dr. *Bose* bei Ortenburg aufgefunden; hohe Rothskopf im Vogelsberg, von *Heyden*.

656. *Meleus Lacordaire*.

meleos eitel.

1) *Megerlei* Panz. 3070.

Findeli Bohem. — Illigeri Germ. — Larve Franenfeld Verh. zool. bot. Ver. Wien. III. 1854. pag. 351. — Passau; Rippoldsau im Schwarzwald, von *Heyden*.

657. *Plinthus Germar*.

plinthos Seite.

1) *caliginosus* Fabr. 3071.

didymus Donovan. — Larve Chapuis et Cand. Mém. Liege 1853. p. 547. — Erlangen *Schlemmer*; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald s.; Aschaffenburg s. s.; Hessen, im Süden des Gebietes weniger selten als im Norden, Decan *Scr*.

658. *Adexius Schönherr*.

1) *scrobipennis* Gyllh. 3072.

Wimpfen einmal in einem faulen Eichenast, Decan *Scr*.

G. Tanyrhynchini.

659. *Trachodes Germar*.

trachodes rauh.

1) *hispidus* Linn. 3073.

acanthion Beck. — fasciculatus Dej. — squamifer Gylh. — München; zwischen Argetsried und Gauting durch Streifen, Juli, Dr. *Kr.*; Freising, am 15. April 1867 in der Attachinger Au ein Stück aus Moos gesiebt; Erlangen; einige Stücke bei Seligenstadt unter faulenden, auf der Erde liegenden Buchenästen, Decan *Scr*.

H. Hyperini.

660. *Alophus Schönherr*.

alophos ohne Kamm.

1) *triguttatus* Fabr. 3074.

cordiger Sulz. — melanocordius Herbst. — Van Schrank. —

rufimanus Marsh. — striatirostris Marsh. — trinotatus Marsh. —
Ueberall h., von März bis November.

661. *Hypera* Germar.

hypera Strick.

Phytonomus Schönherr.

phyton Pflanze und nemo weiden, sich nähren.

- 1) *punctata* Fabr. 3075.
media Marsh. — Ueberall h., Juni—November; im März bei München aus Moos erhalten, Dr. Kr.; var. *hostilis* Ziegl. — München, Dr. Gemminger.
- 2) *fasciculata* Herbst. 3076.
Dauci Oliv. — fascicularis Ziegl. — fascienlosa Gylh. — lunata Wollast. — variegata Bach. — stictica Kirby in litt. — Augsburg s.; München, zwischen Hesselöhe und Pullach, durch Streifen, Juli, Dr. Kr.; Steigerwald s.; Darmstadt, Dr. Nebel.
- 3) *intermedia* Bohem. 3077.
♂ fuscescens Bohem. — globosa Dej. — Larve Goureau Ann. fr. 1866. Bull. p. 18. — Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner.
- 4) *elegans* Boh. 3078.
Passau (?).
- 5) *palumbaria* Germ. 3079.
austriaca Meg. — Larve Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1223. — Allgäu, Obergerometer Stark; am Wege von Rosenheim nach Tegernsee, September, Dr. Kr.
- 6) *comata* Bohem. 3080.
palumbaria Dej. — viennensis Sturm. — München; Allgäu, Lehrer Bischoff u. Stark.
- 7) *tessellata* Herbst. 3081.
maculata Redtenb. — Hellwigi Megerle in litt. — Larve Capiom. Revis II. t. 3. f. 2. — Heeger Sitzgsb. Wien. Acad. VII. p. 348. t. 13. — Augsburg; Moosburg, Notar von Sonn.; ein Stück bei Seligenstadt gefunden, Decan Scr.
Die Larve lebt von den Blättern der Schafgarbe (*Achillea Millefolium*) (Leunis.)
- 8) *contaminata* Herbst. 3082.
maculosa Dej. — Moosburg, Notar von Sonn. (1871.)

9) *Oxalidis* Herbst. 3083.

♀ Viennensis Herbst. — ♂ monticola Bach. — croatica Dej. — mehadiensis Dahl. — tessellata Dahl. — Larve Frauenfeld. Verh. zool. bot. Ver. Wien 1863. p. 1224. — Augsburg.

10) *elongata* Payk. 3084.

mutabilis Germ. — palustris Dahl. — punctulata Ziegl. — Augsburg s.; München; Freising; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen, *Schlemmer*; Hessen n. s.

11) *suturalis* Redtenb. 3085.

Augsburg, Schwimmschule, *Schweizer*; Nürnberg, ein Stück; Darmstadt ein Stück, stud. *Weiss*.

12) *Rumicis* Linn. 3086.

Acetosae Oliv. — pyrrhodaetyla Marsh. — albicans Kirby in litt. — elongata Kirby in litt. — griseola Kirby in litt. — Larve Degeer. Mem. V. p. 232. t. 7. f. 10—16. — Goureau Ann. Fr. 1844. p. 49. t. 2. nr. 1. — Augsburg, Professor *Kuhn*, Schmutterthal, *Schwaiger*; Allgäu, *Stark*; München; Freising n. s.; Juni—August; Moosburg, Notar von *Sonn*; Regensburg g.; Nürnberg g.; Wäldchen bei der Herrenhütte an Pappeln, August; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s.; Hessen n. h.

13) *Pollux* Fabr. 3087.

adpersa Fabr. — commaculata Herbst. — fasciolata Villens. — interrupta Marsh. — bitaeniata Kirby in litt. — Larve Bose Stett. Zeitg. 1850. p. 359. — Augsburg s.; München; Freising s.; Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr*. — var. histrio Bohem. — Augsburg, drei Stück; Nürnberg s. — var. Julini Schh. — Frankfurt, einzeln, von *Heyden*.

14) *suspiciosa* Herbst. 3088.

bitaeniata Marsh. — miles Payk. — Larve Kaltenbach, Verh. nat. Verh. Preuss. Rheinld. XIX. p. 75. — Augsburg s.; München; bei Maria Einsiedl, Juni, Tegernsee am Wege zum Westenhof, April, Rosenheim, September, Dr. *Kr*.; Freising s.; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg h.; Hessen n. h.

15) *Viciue* Gylh. 3089.

grisea Dej. — nigropunctata Khuenburg in litt. — Larve Perris Mem. Ac. Lyon. 1851. p. 93. — Augsburg n. s., Ablass, Mai; München; Freising n. s., Attachinger Au, Mai; Nürnberg n. s.; Hessen n. h.

16) *Plantaginis* Degeer. 3090.

naevia Gmel. — Spartii Hoppe. — cordicollis Kirby in litt. — Larve Degeer Mem. V. p. 237. t. 7. f. 17—21. — Ueberall h. Mai und Juni aus Isargenist, von Bogenhausen, August, Dr. Kr.

Er ist leicht aus der Larve zu ziehen, die Larve verpuppt sich in einem weitmaschigen Cocon auf der Unterseite der Blätter.

17) *murina* Fabr. 3091.

elongata Steph. — nebulosa Steph. — fuscocinerea Marsh. — Plantaginis Marsh. — variabilis Wollast. — dorsigera Kirby in litt. — Larve Degeer. Isis. 1848. p. 979. t. 8. f. 1—11. — Augsburg s.; München: Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.; bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan Scr. — var. melancholica Fabr. — München, Dr. Gemminger.

18) *variabilis* Herbst. 3092.

bimaculata Marsh. — murina var. Wollast. — phaeopus Steph. — picipes Steph. — postica Steph. — sublineata Steph. — villosula Steph. — interstincta Kirby in litt. — stramina Kirby in litt. — Larve Audouin, Ann. sc. nat. ser. 2. XI. p. 107. — Augsburg, Schwimmschule, Schweiger; München; Freising, Wald bei Thalhausen, April, bei Düreneck, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s., Herrenhütte, September; Aschaffenburg s. h.; Hessen h.

19) *Poligoni* Linn. 3093.

cinerea Oliv. — fasciata Degeer. — striata Herbst. — Ueberall n. s., Mai—August.

Die röthlich weisse Larve höhlt nach Bouché die Triebe der Gartennelken aus).

var. arator Marsh. — München, Gemminger.

20) *Munzii* Germ. 3094.

lineata Herbst. — Dinkelsbühl an Binsen, Pfarrer Wolff; Marburg ein Stück, Decan Scr.

21) *striata* Bohem. 3095.

alternans Meg. — lineata Dahl. in litt. — Nürnberg ein Stück.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)