

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

O. Coryssomerini.

691. *Coryssomerus* Schönherr.

korysso ich bewaffne, meros Schenkel.

1) *capucinus* Beck. 3254.

Zusmarshausen; Augsburg, Geisberg am Lech, *Schweiger*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s. s.; im Odenwald, bei Seligenstadt und in Rheinhessen einzeln von Herrn Decan *Scr.* gesammelt, bei Frankfurt von Senator von *Heyden* und stud. *Böttger*.

P. Tychini.

692. *Lignyodes* Schönherr.

lignyodes, russig, rauchig.

1) *enucleator* Panz. 3255.

bicolor Germ. — Augsburg, zwei Stück, Professor *Kuhn*; München; Freising n. h., Attachinger Au, auf Weiden, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s., Bruderwörth, bei Frankfurt von Dr. *M. Schmidt*, bei Rödelheim von *Twardowski* häufig von blühenden Eschen geklopft.

693. *Elleschus* Stephens.

elleschos bekannt, gezeichnet.

1) *scenicus* Payk. 3256.

placidus Herbst. — rubicundus Herbst. — undatus Ulr. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Passau; Regensburg n. s.; Erlangen, *Schlemmer*; Steigerwald n. s. auf Weiden; Aschaffenburg s., Professor Dr. *Döbner*; Seligenstadt sehr einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt s., von *Heyden*.

2) *bipunctatus* Linn. 3257.

ruficornis Zetterst. — unipunctatus Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai; Passau; Regensburg n. s. Erlangen, *Schlemmer*; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. auf *Salix capra*; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiete häufig auf Saalweiden, Decan *Scr.*

694. *Tychius* Schönherr.

Tychios ein Eigenname.

- 1) ***quinquemaculatus*** Linn. 3258.
 quinquepunctatus Linn. — quinquepunctatus Mannerh. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Wulfertshausen, Mai; München; Ammerland, Juni; Freising h., Plantagenwald, Wald bei Wippenhausen und bei der Wiesenkirche, Mai bis Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h., auf *Sarothamnus scoparius*, Herrenhütte, August, Wibelsberg h. im Frühjahr auf *Orobus vernus*, *Orobus niger*, *Vicia pisiformis* und *Lathyrus tuberosus*; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall h.
- 2) ***venustus*** Fabr. 3259.
 albolineatus Ziegl. — bivittatus Marsh. — genistaecola Chevrol. — nervosus Marsh. — parallelus Oliv. — pegaso Herbst. — vernalis Reich. — vittatus Germ. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*; Frankfurt s., von *Heyden*.
- 3) ***polylineatus*** Germ. 3260.
 lineolatus Meg. — Augsburg; München; Erlangen, *Schlemmer*.
- 4) ***Schneideri*** Herbst. 3261.
 lineatellus Schönh. — lineatulus Steph. — Einige Stücke bei Ober-Lais aufgefunden, Decan *Scr.*, von v. *Heyden* im Frankfurter Wald und bei Falkenstein im Taunus gesammelt (lineatulus Germ.).
- 5) ***Genistae Bohem.*** 3262.
 Nach von *Heyden* bei Frankfurt selten vorkommend. (var. von *venustus* F.)
- 6) ***tomentosus*** Herbst. 3263.
 picirostris Gylh. — *Stephensi* Schönh. — villosus Marsh. — Augsburg, Lechhausen, Mai; München; Freising n. s., Weihenstephan, Pförer Au, von Bäumen geklopft, Mai, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Erlangen, *Schlemmer*; Steigerwald s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.; Hessen überall h.
- 7) ***juncus*** Reich. 3264.
 canescens Marsh. — suturalis Megerle in litt. — Augsburg s.; München. im englischen Garten, April, bei Bogenhausen, Mai, Dr. *Kr.*; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg,

Strietwald, Zingenberg in der Bergstrasse in Mehrzal gesammelt, Decan *Scr.*

- 8) **curtus** *Brisout.* 3265.

flavicollis Schh. — Ein Stück im Rebstock Wald bei Frankfurt von v. *Heyden* aufgefunden.

- 9) **Meliloti** *Steph.* 3266.

raptorius Germ. — Augsburg; Freising ein Männchen; Steigerwald; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden*.

A. **Pachytychius** *Jekel.*

- 10) **sparsutus** *Oliv.* 3267.

Auf Gevista bei Frankfurt, Rüdesheim, Oberstein und Ems von Senator von *Heyden* gesammelt.

B. **Miccotrogus** *Schönherr.*

- 11) **cuprifer** *Panz.* 3268.

procerulus Kiesw. — sericeus Ulr. — Ulmi Chevrol. — Zusmarshausen; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*.

- 12) **picirostris** *Fabr.* 3269.

cinerascens Marsh. — fuscirostris Payk. — Augsburg; München, bei der Georgenschweige gestreift, Juni, bei Bogenhausen, Mai, bei Föhring, Juni, in Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, Attachinger Au, Plantagenwald von Bäumen geklopft, April bis Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Dinkelsbühl, September; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg n. h.; Hessen überall h.

695. **Sibynia** *Germar.*

Sibynes *Schönherr.*

- 1) **pellucens** *Scop.* 3270.

cana Herbst. — Augsburg h., Spickel, Juni; München; Freising h., Weihenstephan, Wald bei Thalhausen, Wiesenwald, Isarufer, Mai bis August; Regensburg n. g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Aschaffenburg n. s.; bei Seligenstadt und in Rheinhessen, Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden*.

- 2) **Viscariae** *Linn.* 3271.

Ajugae Herbst. — Augsburg, Lechfeld bei Mering, am 20. Juni; München, zwischen Brunnthal und Föhring auf einer Wiese durch Streifen, Juni, bei der Georgenschweige, Juni bei Nymphenburg, Juni, Dr. *Kr.*; Freising s. Weihenstephan, Juli; Moosburg,

Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Frankfurt, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

3) *fugax* Germ. 3272.

Nach von *Heyden* bei Frankfurt vorkommend.

4) *vittata* Germ. 3273.

Ein Exemplar bei Seligenstadt gefunden, Decan *Scr.*

5) *Potentillae* Germ. 3274.

pyrrhodaetyla Marsh. — villosa Marsh. — Viscariae Steph. — Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; bei Ober-Lais einige Mal, Decan *Scr.*

6) *phalerata* Steph. 3275.

arenariae Steph. — centromaculata Villa. — primita Herbst. — dorsalis Sturm. — Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Frankfurt, von *Heyden*.

7) *primita* Herbst. 3276.

parvula Steph. — signata Panz. Gylh. — Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s. s.; Hessen s.

Q. Clonini.

696. *Cionus* Clairville.

kionis Träubchen.

1) *Scrophulariae* Linn. 3277.

Blattariae Panz. — punctulatus Voet. — Larve Perris. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291. — Ueberall n. s., Juni bis September.

Seine Larven finden sich auf *Scrophularia nodosa*, sie sind bräunlich grün. Mitte Juli verpuppen sie sich auf der Pflanze in ein glasiges Cocon, nach drei Wochen erscheinen die Käfer. Wahrscheinlich entsteht eine doppelte Generation. In der Larve schmarrotzt *Chrysocharis conspiciua*. Das Männchen des Käfers unterscheidet sich von dem Weibchen durch ein längeres letztes Tarsenglied und ungleiche Klauen, die äussere ist kürzer als die innere.

2) *tuberculosis* Scop. 3278.

Verbasci Fabr. — *Scrophulariae* var. d. Latr. — Larve Bouché. Nat. Ins. 1834. p. 198. — Ueberall n. s. auf *Verbascum*, Juni bis September.

3) **Olivieri** Rosenschld. 3279.

Thapsus Oliv. — Augsburg, Dr. von *Weidenbach*; München; Regensburg s. s.; Nürnberg; Aschaffenburg n. s.; Babenhausen in Mehrzahl auf Wolllumen, Decan *Scr.*

4) **similis** Müll. 3280.

Thapsus Fabr. — hortulanus Fourer. — olens Falderm. — Scrophularia Latr. — Thapsi Germ. — Larve Perris Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291. — Ueberall n. s. auf Verbasum. — var. hortulanus Marsh. — Ueberall n. s., Juni, Juli, auf Verbasum-Arten.

5) **olens** Fabr. 3281.

Larve Goedart. Métam. Nat. 1740. II. p. 20. Exp. 10. — Augsburg s. s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Erlangen; Darmstadt, bei der Täubcheshöhle auf Wollblumen, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

6) **Blattariae** Fabr. 3282.

bipustulatus Marsh. — Larve Peragallo, Ann. Fr. 1866. Bull. p. 47. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Fichtelgebirg; Fränkische Schweiz; Koppenwind s. an Scrophularia nodosa; Aschaffenburg n. h.; Hessen h.

7) **pulchellus** Herbst. 3283.

immunis Marsh. — Solani Gylh. — Augsburg s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Erlangen; Aschaffenburg s.; Hessen n. h.

8) **Solani** Fabr. 3284.

perpensus Rossi. — setiger Germ. — spinosulus Meg. — setosus Hellw. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Erlangen, *Schlemmer*; Fichtelgebirg; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*

A. **Stereonychus** Suffr.

9) **Fraxini** Degeer. 3285.

foetidus Fabr. — Geeri Gmel. — Larve Snell. v. Vollenh. Tijdschr. Nederl. ent Ver. II. 1858. p. 156. fig. — Augsburg, Professor *Petry*; München; Fränkische Schweiz; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

697. *Nanophyes* Schönherr.

nanophyes zwergähnlich.

A. Sphaerula Kiesenwetter.**hemisphaericus** Oliv. 3286.¹ Larve Dufour. — Ann. Fr. 1854. p. 651. t. 19. III. — var. mi Germ. — Regensburg n. s.2) **Lythri** Fabr. 3287.

fasciatus Villers. — leucozonius Gmel. — Salicariae Oliv. — transversus Oliv. — vittatus Fourcr. — Ueberall h. von Mai bis November, besonders auf Lythrum Salicaria und auf Weiden. Die Larve lebt in den Stengeln von Lythrum Salicaria.

B. Nanophyes Schönherr.3) **globulus** Germ. 3288.pygmaeus Herbst. — stramineus Bach. — München; Regensburg n. s.; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr*.**R. Gymnetrini.**698. *Gymnetron* Schönherr.

gymnos nackt, etron der Bauch.

1) **pascuorum** Gylh. 3289.collinum Steph. — nanum Dej. — Augsburg; München; Erlangen; bei Königstein im Taunus, Senator von *Heyden*.2) **villosulum** Gylh. 3290.Larve Bouché. Naturg. Ins. I. 1834. p. 202. t. 10. f. 22—23. — Löw. Allg. deutsch. nat. hist. Zeitg. II. 1847. p. 290. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Erlangen, *Schlemmer*; Egloffstein h., auf Veronica Beccabunga, Juni.3) **Beccabungae** Linn. 3291.concinnum Gylh. — Zusmarshausen; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschbach g. an Veronica Anagallis; Seligenstadt in Mehrzahl gefunden, Decan *Scr*. — var. Veronicae Germ. — nigrum Germ. in litt. — Augsburg; München; Regensburg g.; Aschaffenburg n. s.; Hessen h.

4) **labile** *Herbst.* 3292.

marmoratum Fourer. — obliquum Sturm. — tricolor Marsh.
— Augsburg s., Wippenhausen, Juli; München; Freising s., Plan-
tagenwald, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.;
Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Seligenstadt
einzeln, Decan *Scr.*

5) **stimulosum** *Germ.* 3293.

Regensburg g.; mehrmals bei Seligenstadt, Decan *Scr.*

6) **rostellum** *Herbst.* 3294.

Augsburg s.; München; Regensburg s.; Nürnberg; Aschaff-
enburg s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Hanau, Dr. *Hille.*

7) **melanarium** *Germ.* 3295.

intaminatum Steph. — perparvulum Bohem. — Bei Seligen-
stadt und Ober-Lais einige Stücke gefunden, Decan *Scr.*

A. Rhinusa *Steph.*8) **Asellus** *Grav.* 3296.

♀ cylindrirostre Gylh. — nasutum Rosensch. — polonicum
Rosensch. — plagiatum Gylh. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*;
Darmstadt in Mehrzahl gefunden, stud. *Weiss.*

9) **thapsicola** *Germ.* 3297.

München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; bei Seligenstadt auf
Verbascum in Mehrzahl gefunden, Decan *Scr.*

10) **netum** *Germ.* 3298.

ellipticum var. ♀ Steph. — pellicum Gylh. — Passau; Ein
Exemplar hat Senator von *Heyden* bei Rüdesheim gefunden.

11) **spilotum** *Germ.* 3299.

bimaculatum Sturm. — bipustulatum Rossi. — melaraphum
Ulr. — Bei Darmstadt von Dr. *Nebel* gesammelt.

12) **collinum** *Gylh.* 3300.

Augsburg; bei Seligenstadt einige Mal, Decan *Scr.*

13) **Linariae** *Panz.* 3301.

curvirostre Rossi. — tetrum Panz. — Orontii Hellw. in litt
— Larve Kaltenb. Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 1862. p. 84. —
Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., die Larve
lebt in Anschwellungen der Wurzel von *Linaria vulgaris*, der
Käfer ist leicht zu ziehen; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaff-
enburg s. h.; Rheinessen n. s. an Leinkraut, Decan *Scr.*

- 14) *titrum* Fabr. 3302.

Larve Heeger. Sitzgsb. Wien. Ac. 34. p. 218. t. 3. — München; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.

- 15) *Antirrhini* Payk. 3303.

Osyridis Germ. — Larve Cornelius Stett. Zeitg. 1863. p. 117. — Augsburg; München, bei den Kalköfen oberhalb Thalkirchen, Juni, Dr. Kr.; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt n. s., Decan Scr.

- 16) *noctis* Herbst. 3304.

Antirrhini Marsh. — Larve Frauenf. Verh. zool. bot. Verh. Wien. 1863 p. 1227. — München; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg g.; Steigerwald s.; Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner; Seligenstadt einige Stücke, Decan Scr.

- 17) *pilosum* Gylh. 3305.

Nürnberg ein Stück; Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner.

- 18) *Plantaginis* Eppelsheim. 3306.

Rheinpfalz.

699. *Miarus* Stephens.

miaros gefleckt.

Cleopus Suffrian.

- 1) *graminis* Gylh. 3307.

ellipticus Herbst. — Augsburg n. s., Leitershofen; München; Ammerland, Juni; Freising h., Attachinger Au, Pförer Au, April bis Juli; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Allgäu, Stark.

- 2) *Campanulae* Linn. 3308.

acephalus Marsh. — fossarum Meg. — Linariae Ziegl. — Rannunculi Müll. — Larve Laboulb. Ann. Fr. 1858. p. 900. t. 17. I. — Augsburg n. s.; München; Tegernsee im Lerchenwald, August, Miesbach, August, Dr. Kr.; Freising n. s., Pförer Au, Mai; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald h. in den Blüten von Campanula-Arten; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg h.; Hessen überall h., Allgäu, Stark.

- 3) *micros* Germ. 3309.

Von v. Heyden bei Frankfurt einmal auf Erica gefunden.

4) **plantarum** Germ. 3310.

acephalus Marsh. (pars.) — soinnulentus Villa. — Regensburg s., bei Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*

S. Cryptorhynchini.700. **Orobites** Germar.

orobites einer Kichererbse ähnlich.

1) **cyaneus** Linn. 3311.

globosus Fabr. — giganteus Meg. — hypoleucus Quens. — Zusmarshausen; München; Freising n. s., April bis Juli; Attachingen Au; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. h. Fälzner Weiher auf Weiden, August; Steigerwald ziemlich s. im Grase; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s. s., auf jungen Waldschlägen; Hessen im ganzen Gebiete n. h.

701. **Camptorhinus** Schönherr.

kamptos biegsam, gebogen, rhin Nase.

1) **stultus** Rossi. 3312.

Erlangen; Aschaffenburg s. s., Schmerlenbacher Wald, bei Soden im Winterschlaf gesellig unter der Rinde von Eichen und zahmen Castanien aufgefunden, Senator von *Heyden*; Ober-Lais einige Mal an alten Eichen gefunden, Decan *Scr.*

702. **Acalles** Schönherr.

akalles missgestaltet.

1) **Camelus** Fabr. 3313.

Quercus Bohem. — Ein Stück im Bonfelder Wald bei Wimpfen an einem morschen Eichenaste gefunden (*Scr.*)

2) **Aubei** Bohem. 3314.

Wolff Walzl in litt. — Nürnberg, ein Stück an einer Eiche auf dem Schmausenbuck, August.

3) **Roboris** Curtis. 3315.

abstersus Bohem. — Naviersi Bohem. — variegatus Steph. — Aschaffenburg, Professor *Oechsner*, Taunus, einmal gefunden, Senator von *Heyden*.

- 4) **Lemur Germ.** 3316.
sulcatus Bohem. — fallax Bohem. — Moosburg, Notar v. *Sonn.*
- 5) **turbatus Bohem.** 3317.
ptinoides Latr. — Aschaffenburg s.; Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr.*
- 6) **ptinoides Marsh.** 3318.
nocturnus Boh. — Erlangen, *Schlemmer*; Frankfurt ein Stück Senator von *Heyden*; Giessen ein Stück, *Laubenheimer.*
- 7) **hypocritus Bohem.** 3319.
München; oberhalb Maria Einsiedl unter Buchenrinde, Dr. *Gemminger*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Fränkische Schweiz; Ems unter Rubus-Gesträuch ein Exemplar, Senator von *Heyden.*

703. **Gasterocercus Laporte.**

gaster Bauch, kerkos Schweif.

- 1) **depressirostris Fabr.** 3320.
anthripoides Chevrol. — Dumerili Lap. et Brullé. — oblitus Dej. — plicatus Herbst. — *Reissig* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer* fanden diesen seltenen Käfer einzeln bei Darmstadt im Holzhofer; *Stern* in Frankfurt a. M. hat ihn in vielen Exemplaren aus Holz erzogen.

704. **Cryptorhinchus Illiger.**

kryptos verborgen, rhynchos Rüssel.

- 1) **Lapathi Linn.** 3321.
albicaudis Deg. — albipodex Voet. — trimaculatus Panz. — carbonarius Scop. — Larve Curtis. Trans. Linn. Soc. I. 1791. p. 86. t. 5. — Zusmarshausen; Augsburg n. s. an Weiden und Erlen; München; Geiseltasteig, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Lauingen a. d. Donau; Passau; Regensburg; Nürnberg, Schmausenbuck, August; Erlangen; Weiden und Culmbach n. h., *Schmidt*; Fichtelgebirg; Steigerwald s. an Rumex-Arten; Aschaffenburg; Hessen im ganzen Gebiet, manchmal häufig auf Weiden vorkommend.

Die Larve lebt auf Weiden und jungen Erlen. Die Eier werden vom Weibchen im Mai nahe an der Erde in die Rinde gelegt, gewöhnlich an jungen Erlen, und die alsbald ausschüpfende Larve bohrt sich in das Innere und nach oben, kehrt sich zur Verpuppung am Ende des Ganges um, und nach 14 Tagen Puppen-

ruhe ist der Käfer fertig, der aber, selbst wenn er zur hohen Sommerszeit zur Vollendung kam, seine Geburtsstätte nicht eher verlässt als im nächsten Frühjahr. Die Larve braucht wahrscheinlich ein Jahr zu ihrer Entwicklung. Sie hat in ihrem Körperbau nichts Abweichendes von andern Rüsselkäferlarven. Die jungen Loden müssen deshalb abgetrieben werden.

T. Rhamphini.

705. *Rhamphus* Clairville.

r a m p h o s Schnabel.

1) *flavicornis* Clairv. 3322.

Oxyacanthae Marsh. — pulicarius Payk. — Larve Heyden. Berl. Zeit. 1862. p. 63. — Augsburg n. s.; München bei Bogenhausen, Juni, Dr. Kr.; Freising s.; Weihenstephan, Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschbach n. s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen durchs ganze Gebiet vorkommend. Nach von Heydens Beobachtungen minirt die Larve in Kirschen, Birnen, Schlehen und Birkenblättern.

2) *aeneus* Bohem. 3323.

subaeneus Illig. — Regensburg n. s.; Deidesheim in der Pfalz (Dr. Eppelsheim).

U. Ceutorhynchini.

706. *Mononychus* Schönherr.

monos allein, eine, onyx Klaue.

1) *punctum-album* Herbst. 3324.

Pseudacori Fabr. — Salviae Germ. — deauratus Dahl. — Larve Westw. Introd. 1839. I. p. 345. fig. 41. 20. — Augsburg, Gscheidlen; München; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, Schlemmer; Aschaffenburg s. s.; einige Exemplare aus dem Moorgrund bei Dettingen auf Iris Pseudacorus; Darmstadt Oberstlieutenant Klingelhöffer und Dr. Nebel.

707. *Coeliodes* Schönherr.

koliodes bauchig.

1) *trifasciatus* Bach. 3325.

Einige Stücke bei Ober-Lais aufgefunden, Decan Scr.

- 2) **ruber** Marsh. 3326.
 Quercus Oliv. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Steigerwald s.; Ober-Lais einzeln gesammelt, Decan *Scr.*, Ortenburg, Dr. *Bose*.
- 3) **rubicundus** Payk. 3327.
 Zusmarshausen; Augsburg; München, bei der Bogenhauser Brücke, Juli, Dr. *Kr.*; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Steigerwald s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s. s.; Frankfurt, von *Heyden*; Ortenburg, Dr. *Bose*.
- 4) **Epitobii** Payk. 3328.
 Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg, Prof. Dr. *Döbner*; Frankfurt, von *Heyden*; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*
- 5) **Cardui** Herbst. 3329.
 guttula Fabr. — guttula var. b. Gylh. — canaliculatus Gylh. — umbrinus Gylh. — carduelis Meg. in litt. — fuliginosus Marsh. — ruficornis Steph. — Hedenborgi Bohem. — Pruni Bohem. — Larve Rupertsb. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1870. p. 837. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Passau; Nürnberg n. h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenburg, Dr. *Bose*.
- 6) **fuliginosus** Marsh. 3330.
 Pruni Bohem. — umbrinus Gylh. — canaliculatus Gylh. — Augsburg, Spickel in Moos, December; München; Freising n. s., Wald bei Thalhausen, April, Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg s.; bei Seligenstadt und Frankfurt n. s., Decan *Scr.* Wird von Herrn Dr. *Gemminger* zu Cardui Herbst (guttula Fabr.) gezogen.
- 7) **erythroleucos** Gmel. 3331.
 subrufus Herbst. — cinctus Rossi. — tricinctus Walkenaer. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., Weihenstephan und Wald bei Thalhausen von Bäumen geklopft, Mai; Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. s., Wäldchen bei der Herrenhütte von niederen Pflanzen gestreift, August, September; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiet vorkommend.
- 8) **Lamii** Fabr. 3332.
 leucampyx Germ. — melanostictus Dahl. — variegatus Ziegl. — Augsburg, Spickel, November; München; Freising n. h., Wald bei Wippenhausen, August; Regensburg n. s.; Eichstädt; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Steigerwald s. s.; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Taunus

von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*. — var. *punctulum* Herbst.
— Regensburg s.

9) *Geranii Payk.* 3333.

affinis Payk. — *exiguus* Oliv. — lima Meg. — Zusmarshausen;
Augsburg; Allgäu, *Stark*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regens-
burg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Steigerwald n.
s.; Aschaffenburg h., auf *Geranium pratense*, Professor Dr. *Döb-
ner*; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*;
Wimpfen, Pfarrer *Wolff*; am Staufstein im Vogelsberg h.,
von *Heyden*.

10) *exiguus Oliv.* 3334.

Augsburg; Regensburg n. s.; Marburg ein Exemplar. Wird
von Herrn Dr. *Gemminger* zu *Geranii* gezogen.

708. *Megacoetes Thomson.*

megaketes sehr ausgehöhlt.

1) *dryadus Gmel.* 3335.

Quercus Fabr. — *rana* Fabr. — *pallens* Marsh. — Zusmars-
hausen; Augsburg; München; Freising n. s., Wald bei Thal-
hausen von Bäumen geklopft, April; Regensburg s. s.; Dinkels-
bühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s., Oktober; Erlangen; Aschaff-
enburg s.; Hessen n. s.

2) *quadrinaculatus Linn.* 3336.

didymus Fabr. — *albopunctatus* Goeze. Gmel. — *bipunctatus*
Gmel. — ♂ *oleraceus* Scop. — *tripunctatus* Fourer. — *Urticae* Schrank
— *urticarius* Clairv. — *viduus* Panz. — Larve Goureau. Ann. Fr.
1866, p. 172. — Ueberall h.

709. *Scleropterus Schönkerr.*

skleros hart, *pteron* Flügel.

1) *serratus Germ.* 3337.

Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln, Decan *Scr.* (als *Sc.*
globulus Herbst.)

710. *Ceutorhynchus Germar.*

keutho ich verberge, *rhynchos* Rüssel.

1) *macula alba Herbst.* 3338.

Cardui Oliv. — *seriatus* Bohem. — Larve Klingelh. Stett.
Zeit. 1843. p. 88. — Augsburg; Regensburg s.; Nürnberg, ein

Stück; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt einzeln, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

Die Larve lebt in Mohnköpfen, oft sind 6–7 Larven in einem Mohnkopfe, dessen Samen alle von ihnen gefressen werden. Zur Zeit der Fruchtreife beißen sie ein Loch in die Kapsel, fallen zur Erde, graben sich 16 Cent. tief ein, verpuppen sich in einem ovalen ausgesponnenen Kokon; nach 20–25 Tagen erscheint der Käfer (*Klingelhöffer*).

2) *suturalis* Fabr. 3339.

Zusmarshausen; Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg h. Wäldchen bei der Herrenhütte, August, November; Erlangen; Aschbach und Ebrach n. s. an *Allium cepa*; Aschaffenburg s., Professor Dr. *Döbner*; Ortenburg, Dr. *Böse*; Ober-Lais s., Decan *Scr.*

3) *alboscuteellatus* Gylh. 3340.

aegrotus Gylh. — consputus Germ. — rubescens Bohem. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*.

4) *arator* Gylh. 3341.

cinerascens Nees v. Esenbeck. — glabrirostris Gylh. — inafectatus Gylh. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einige Stücke, Decan *Scr.*

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)