

# Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von  
**O. Hofmann** Stud. Med., und Dr. **Herrich-Schäffer**.

(Fortsetzung.)

## I. Noctuidae.

### 155. *Triphaena* O.

435. *Fimbria* L. Selten; zwischen Grass und Gebraching.  
 436. \* *Janthina* WV. 1854 von Hfm. bei Alt St. Niklas im August.  
 437. *Orbona* F. Bei Arlesberg.  
 438. *Pronuba* L.  
 Nicht selten; in Hecken; Tegernheimer Bergen. Juni, Juli,  
 August.

### 156. *Opigena* Bd.

439. *Polygona* WV.  
 An den Winzer- und Tegernheimer Bergen, Abends an  
 Blumen schwärmend. Juli. Auch erzogen.

### 157. *Agrotis* O.

440. \* *Candelisequa* WV.  
 Abends an den Tegernheimer Bergen an *Echium* schwär-  
 mend. Juli.  
 441. *Latens* H.  
 An den Winzer- und Tegernheimer Bergen, Abends an  
 Blumen schwärmend. Ende Juni, Juli, Anfang August.  
 442. \* *Pyrophila* HV. Ziemlich selten.  
 443. *Cinerea* Brkh.  
 Sehr selten; bei Tremelhausen; Abends an den Tegern-  
 heimer Bergen an *Echium* schwärmend. Mai, Juni.  
 444. *Ravida* WV.  
 Selten, H. Assessor Bertram fand sie im August bei Prü-  
 fening Abends an Disteln.

445. *Plecta* L. Selten.
446. *Putris* L.  
Selten; Tegernheimer Berge an Baumstämmen sitzend. April.
447. \* *Flammatra* F. Selten.
448. *Tritici* L.  
Nicht selten; auf dem Bruderwörth und der Kuhwiese  
Abends an *Echium* schwärmend. Ende Juli, Anfang August.
449. *Aquilina* WV.  
Selten; Abends an den Tegernheimer Bergen an *Echium*  
schwärmend. Juli.
450. *Obelisca* WV. Selten.
451. *Fumosa* WV. Nicht selten; Tegernheim.
452. *Porphyrea* WV. Selten, bei Gebraching.
453. *Multangula* H.  
An den Winzer- und Tegernheimer Bergen Abends an  
Blumen schwärmend. Ende Juni, Anfang Juli.
454. \* *Forcipula* WV. Erst 1854 an den Winzerbergen Abends  
im Juli gefangen.
455. *Exclamationis* L.  
Gemein; auf Wiesen. Ende Mai, Juni.
456. *Segetum* WV.  
Nicht selten; Abends an den Tegernheimer Bergen an  
*Echium* schwärmend. Juni, Juli.
457. *Corticea* H.  
Nicht selten; wie vorige. Ende Juni, Anfang Juli.
458. *Crassa* H.  
Sehr selten; wie vorige. Ende Juli, Anfang August; bei  
Prüfening an Disteln.
459. *Suffusa* WV. Selten.
158. *Noctua* L.
460. *C nigrum* L. Selten.
461. *Triangulum* Hfn. Selten.  
(*Rhomboidea* Esp. u. *Ditrapezium*. sollten doch wohl auch hier  
aufzufinden seyn.)
462. \* *Festiva* WV. Selten.
463. *Brunnea* WV. Selten.
464. \* *Bella* Brkh. Selten, bei Karthaus.

465. *Baja* WV. Selten.  
 466. \* *Neglecta* H. Sehr selten, seit lange nicht mehr gefunden.  
 467. *Augur* F. Nicht selten.  
 468. *Sigma* WV. Nicht selten; Abends an den Winzerbergen an Blumen schwärmend. Juli.

K. *Heliothides*.

160. *Heliothis* O.

469. *Ononis*.  
 Selten; am Abhange der Tegernheimer Berge in Kleefeldern. Mai. Die Raupe im Juli nicht selten.  
 470. *Dipsacea* L. Häufig am blühenden Klee.  
 471. *Delphinii* L.  
 Sehr selten; Schmetterling einmal an der Schwedenschanze bei Dechbetten und einmal an den Tegernheimer Bergen Abends an *Echium* schwärmend gefangen. Juni. Die Raupe einigemale auf Brachfeldern in ziemlicher Anzahl.

161. *Panemeria* WV.

472. \* *Arbuti* F.  
 Weintinger Holz und Etterzhausen. Ende Mai. (Hfm. Brtr.)

162. *Anarta* O.

473. *Myrtilli* L.  
 Nicht selten; in den Thälern hinter Donaustauf an Haide. Mai, Juni. Die Raupe häufig, auch schon während der Schmetterling fliegt.

L. *Maniidae*.

164. *Mormo* O.

474. *Maura* O. Selten, auf der Holzlande, an Brettwänden, in Etterzhausen. Juli.

P. *Herminidae*.

169. *Herminia* Ltr.

475. *Derivalis* H. Häufig; bei Tegernheim, am Mittelberg, im Weintinger Holz an Eichengebüsch. Ende Juni, Juli.  
 476. *Nemoralis* F. Selten.

477. *Barbalis* L. Häufig im Weintinger Holz, bei Tegernheim.  
Ende Mai, Anfang Juni.
478. *Tarsipennalis* HS. Selten.
479. *Tentaculalis* (—*aris*) L.  
Nicht selten; bei Tegernheim, hinter Donaustauf, im Weintinger Holz in Eichengebüsch. Ende Juni, Anfang Juli.

R. *Plusiidae*.

174. *Abrostola* O.

480. *Urticae* H. Selten; Abends an den Tegernheimer Bergen an Blumen schwärmend. Juli.
481. *Asclepiadis* WV. Sehr selten; wie vorige. Juli.
482. *Triplasia* L. Gemein; wie vorige. Juli.
175. *Plusia* O.
483. *Gamma* L. Die gemeinste Eule. Juli, August.
484. *Jota* L. Selten; in Gärten.
485. *Festucæ* L. Abends an den Tegernheimer Bergen an Blumen schwärmend. Juli.
486. *Chrysitis* L. Gemein; wie vorige. Ende Juni, Juli, Anfang August.
487. *Celsia* L. Einmal Ende August in meinem Zimmer gefangen, einmal bei Grass im Oktober an einer Baumwurzel von E. Hfm. — Hr. v. Welser will sie auch bei Weltenburg am 23. Sept. 1849 gesehen haben.
488. *Moneta* F. Sehr selten, im Stadtgraben.

S. *Erastridae*.

176. *Erastria* O.

489. \* *Atratula* WV. Sehr häufig im Weintinger Holz und bei Hohengebraching. Ende Mai, Anfang Juni.
490. *Fuscula* WV. Weintinger Holz, Tegernheimer Berge, seltener. Ende Mai, Anfang Juni.

T. *Ophiuſidae*.

177. *Catephia* O.

191. *Alchymista* F. Sehr selten; bei Königswiesen einmal gefangen.

178. *Catocala* Schr.

492. *Paranympa* L. Nicht selten; in den Promenaden. Raupe hinter Tegernheim und Donaustauf von Schlehenhecken geklopft.
493. *Electa* F. Selten; Prebrunn, untere Wehr.
494. *Nupta* L. Nicht selten; in den Promenaden, Prebrunn, obere Wehr, an Gartenmauern. September.
495. *Sponsa* L. Nicht selten. Bei Etterzhausen.
496. *Promissa* WV. Nicht selten; wie vorige.
497. *Fraxini* L. Selten; in den Promenaden.

179. *Ophiusa*.

498. \* *Caliginosa* H. Einmal zwischen Pentling und Grossberg auf einer Sumpfwiese gefangen; auch beim Tegernheimer Keller. Juni.
499. *Lunaris* F. Nicht selten; bei Tegernheim und Stauf; die Raupe ist nicht schwer zu finden und zu erziehen.
500. *Viciae* H. Sehr selten, bei Mariaort.
501. *Craccae* F. Sehr selten; Thäler hinter Donaustauf und Grass. Juni.
502. \* *Pastinum* Tr. Selten.

U. *Acontidae*.180. *Acontia* O.

503. *Luctuosa* WV. Gemein. Mai, Juni, Juli, August.

V. *Goniatidae*.182. *Euclidia* O.

504. *Mi* L. Gemein. Mai, Juni.

505. *Glyphica* L. Gemein, auf Kleefeldern. Mai, Juli.

W. *Hypenidae*.183. *Hypena* WV.

506. *Rostralis* L. Häufig in Hecken an den Winzer- und Tegernheimer Bergen. Ende Mai, Anfang Juni — September.
507. *Obesalis* H. Sehr selten; Promenaden, Tegernheimer Berge. Mai — September.

508. *Crassalis* F. Selten; am Abhange des Mittelberges im Juni in gemischten Wäldern.
509. *Proboscidalis* L. Ziemlich selten.
184. *Madopa* Stph.
- 510 *Salicalis* WV. Selten; bei Pentling, Grass und Tegernheim. Juni.
185. *Emmelia* WV.
511. *Sulphuralis* L. Gemein. Mai, Anfang Juni.
186. *Eustrotia* WV.
512. \* *Uncana* L. Auf den sumpfigen Wiesen beim Weintinger Holz, Juni.
188. *Helia* Guen.
513. \* *Calvarialis* H. Ein einzigesmal hinter dem Mittelberge.

X. *Leptosidae*.

189. *Prothymia* WV.
514. *Aenea* WV. Ueberall. Mai—Juli.
190. *Aethia* WV.
515. *Emortualis* WV. Sehr selten; Pentling.
191. *Colposia* WV.
516. *Flexula* F. Nicht selten; im Weintinger Holz. Ende Juni, Juli. Die überwinternde Raupe häufig. Etterzhausen.

Y. *Aglenidae*

193. *Micra* Guen.
517. *Noctualis* H. (Pyr. 138.) *Paula* H. *Noct.* Bei Sinzing im August auf *Gnaphalium*.

**XXXI. Nyctolidae.**

518. *Revayana* WV. Nicht selten; in Schlägen bei Grass und Weinting. Juli—September. In allen Varietäten. Leicht zu erziehen.

198. *Chloëphora* Stph.
519. *Prasinana* L. Nicht selten. Schmetterling im Frühling. Raupe im Herbst auf Buchen im Weintinger Holz und bei Etterzhäusern.
520. *Quercana* H. Seltener als die vorige. Juni. Raupe im Mai.
199. *Rivula* Guen.
521. *Sericealis* WV. Selten; Weintinger Holz.
200. *Earias* HV.
522. *Clorana* L. Bei Weinting und Grass gefangen. Mai, Juni. Leicht zu erziehen.

### XXXII. Brepidae.

202. *Brepfos* O.
523. *Notha* H. Selten.
524. *Parthenias* L. In Birken schlägen bei Hohengebraching und im Weintinger Holz. März und April. Häufig.

### *Geometridae.*

#### XXXIII. Dendrometridae.

##### 203. *Geometra.*

525. *Papilionaria* L. Ziemlich überall, doch selten. Mai und Juli. Oefter findet man die Raupe.
526. *Aestivaria* H. Wird öfter aus Heckenraupen erzogen als gefangen. Juni, Juli.
527. *Bupleuraria* WV. Nicht selten; an den Tegernheimer Bergen und im Weintinger Holz. Juli.
528. *Porrinaria* Zell. (nicht *Viridaria*). Nicht selten; Abends im Weintinger- und Etterzhäuser Holz und an den Hecken bei Tegernheim. Juni, Juli. Wir beobachteten keine doppelte Generation.
529. *Putataria* L. Häufig in Schlägen mit Heidelbeeren, besonders an der Nordseite der Berge. Ende Mai, Anfang Juni.

530. *Aeruginaria* WV. Nicht häufig; im Weintinger Holz und hinter Donaustauf. Ende Mai, Anfang Juni.
531. *Fernaria* L. Nicht selten; an den Winzer- und Tegernheimer Bergen. Juni, Juli. Raupe auf *Clematis vitalba*. Einfache Generation.
204. *Pseudoterpna* HV.
532. *Cytisaria* WV. Häufig; die Raupe auf *Cytisus nigricans*, bei Lappersdorf, Weinting &c. Juli.
205. *Acidalia* HS.
533. *Amataria* L. Nicht gemein; in Gärten, am Keilstein. Juli, August.
534. *Vibicaria* L. Nicht selten; an den Tegernheimer Bergen. Juni.
535. *Scutularia* WV. Selten; in Gärten, auch bei Tegernheim.
536. \**Reversaria* Tr. Selten.
537. *Incanaria* H. Häufig; in Häusern, auch in der Stadt; Winzerberge. Fast den ganzen Sommer hindurch.
538. *Straminaria* Tr. Nicht selten; bei Regendorf, auf den Höhen hinter Stauf. Juni.
539. \**Bisetaria* Hfn. Selten. Juli.
540. *Aversaria* (-ata) L. Häufig; in Hecken und Gärten. Ende Juni, Juli, Anfang August.
541. *Suffusaria* Tr. Selten; in Hecken beim Tegernheimer Keller, im Weintinger Holz. Juli.
542. \**Deversaria* HS. Selten.
543. \**Interjectaria* Bd. Selten.
544. *Ossearia* WV. In Unzahl, an den Bergabhängen von Winzer bis Stauff. Ende Juni, Anfang Juli.
545. \**Holosericearia* Dup. Häufig; Tegernheimer Berge und Mittelberg. Ende Mai, Juni, Juli.
546. *Pallidaria* WV. — *Byssinata* ist das Weib. — Häufig; in Schlägen beim Mittelberg, Weinting und Kleinprifling. Ende Mai, Anfang Juni.
547. *Perochraria* FR. Häufig; in Schlägen bei Tremelhausen, Grass, Tegernheim und im Weintinger Holz. Ende Juli, Anfang August.

548. *Rufaria* H. Gemein an den Tegernheimer Bergen. Ende Juni, Juli, Anfang August.
549. *Moniliaria* WV. Nicht selten; an den Tegernheimer Bergen, besonders am Nittelberg, auf Eichenlaub ruhend. Juli.
550. \* *Commutaria* Fr. Selten; in Nadelholzschlägen, nördlicher in der Oberpfalz sehr gemein.
551. *Rubricaria* WV. Häufig; auf Kleefeldern. Juli.
552. \* *Remutaria* (—*ata*) L.? Häufig; in Schlägen bei Pentling, Grossberg, Stauf, Weinting &c. Juni.
553. *Sylvestraria* Tr. Nicht selten; im Weintinger Holz, bei Hohengebraching. Juli, Anfang August.
554. *Mutataria* Tr. Häufig; in Hecken, besonders am Keilstein. Juni, Juli.
555. *Immutaria* L. Viel seltener.
556. *Contiguaria* H. Einzeln.
557. *Ornataria* WV. Häufig; auf Wiesen und am Keilstein. Ende Mai, Anfang Juni — August.
558. \* *Decoraria* WV. Selten; auf den Tegernheimer Bergen und am Bruderwehr. Juli, August.
559. \* *Immoraria* (—*ata*) L. Im Weintinger Holz. Juni, August.
560. *Strigaria* H. Sehr selten.
561. *Exemptaria* HV. (*Prataria* Bd.) Nicht selten; hinter dem Mittelberge.
562. *Aureolaria* WV. Häufig, an den Bergabhängen des Keilstein. Juli.
563. *Auroraria* H. — (*auroralis* WV.) Einzeln; bei Roith, hinter Tegernheim, im Weintinger Holz an *Carpinus*-Hecken. Juli.
564. *Emarginaria* (—*ata*) L. Nicht selten; im Weintinger Holz, bei Hohengebraching. Juni, Juli, August; wohl doppelte Generation.

206. *Zonosoma* Led.

565. \* *Trilineararia* Brk. Nicht selten; bei Etterzhausen, bei Stauf. Wir haben in dieser Gattung nur von dieser Art die doppelte Generation noch nicht beobachtet. Ende Mai, Anfang Juni.
566. *Punctaria* L. Einzeln; an Eichen bei Tegernheim, Crass, Weinting. Ende Mai, Anfang Juni. — Ende Juli, Anfang August.

567. *Omicronaria* WV. Selten; im Weintinger Holz, bei Pentling. Juni — August.
568. *Pendularia* L. Gemein; in Birkengebüsch. Mai — August.
569. *Orbicularia* H. Sehr selten; wahrscheinlich aus Raupen aus dem Weintinger Holz. Juni.
570. *Poraria* (—*ata*) L. Gemein; in Birkengebüsch bei Weintinger, Etterzhäusern und Tegernheim. Juni, Juli, Anfang August.

212. *Parascotia* WV.

571. *Fuliginaria* L. (*Carbon.* WV.) Nicht selten; in Häusern und Holzkammern. Juli, August.

215. *Metrocampa*.

572. *Fasciaria* L. Nicht selten; die rothe *Var.* ist häufiger; bei Tegernheim, Grossberg, Pentling und Hohengebraching. Ende Juni, Anfang Juli.
573. *Margaritaria* L. Selten; in Buchenwäldern. Juni. Wir beobachteten in dieser Gattung keine doppelte Generation.

216. *Eugonia* WV.

574. *Tiliaria* Brkh. Selten; Etterzhäusern; wie alle Arten der Gattung im Spätsommer.
575. *Alniaria* L. Nicht selten; bei Hohengebraching, im Weintinger Holz, auch in den Promenaden. August, Anfang September.
576. *Quercinaria* H. Nicht selten; an Eichen bei Grossberg und Hohengebraching. Ende August, Anfang September. Die spezifischen Unterschiede von folgender Art sind noch nicht fest.
577. *Erosaria* WV. Viel seltener; an Eichen im Grasser Wäldchen. Ende August, Anfang September.
578. *Angularia* WV. Nicht selten; in Buchenwäldern bei Etterzhäusern.

217. *Crocallis*.

579. *Elinguaria* L. Nicht selten; geschlüpft im August. Wir bezweifeln die doppelte Generation.

(Fortsetzung folgt.)