

Systematische Uebersicht der Käfer,
welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

564. *Scaphidema Redtenbacher.*

skaphe Kahn, demas Körper.

1) *metallicum* Fabr. 2746.

bicolor Fabr. — aeneum Payk. — ahenum Marsh. — Larve Westwood. Introd. mod. Class. Ins. I, p. 314. f. 37. Nr. 11–19. — Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn*; Regensburg n. g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt s., Decan *Scr.*; Frankfurt, *M. Schmidt*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

565. *Platydemia Laporte.*

platys breit demas Leib.

1) *violaceum* Fabr. 2747.

dytiscoides Rossi. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 346. — München; Regensburg s. s.; Aschaffenburg s. s., nur einmal in der Fasanerie; Frankfurt, von *Heyden*; Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt, Lieutenant *Scr.*

566. *Pentaphyllus Latreille.*

penta fünf, phyllon Blatt.

1) *testaceus Hellwig.* 2748.

Larve Erichs. Wieg. Arch. 1842. I, p. 366. — Letzn. Arb. schles. Ges. 1853. p. 218. f. 39–40. — Erlangen s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s.; Hessen n. s. s., in hohlfäulem trockenem Eichenholz, Decan *Scr.*

G. Ulomini.

567. *Tribolium Mac Leay.*

tris dreimal bole Wurf, Wegwurf.

Margus Redtenbacher.

1) *ferrugineum* Fabr. 2749.

navale Fabr. — testaceum Fabr. — castaneum Herbst — cinnamomeum Herbst. — Larve Westw. Introd. mod. Class. Ins. I, p. 319. f. 39. Nr. 2. — Lucas Ann. Fr. 1855. p. 249. t. 13. III.

— München; Passau, Dr. *Waltl*; Nürnberg, von Buchbinder Wel-
des eine grosse Partie Käfer erhalten, welche sich in einem Mehl-
wurmhaufen entwickelt hatte; Erlangen; Aschaffenburg n. s.;
Seligenstadt in Spezereiwaaren, Decan *Scr.*; Frankfurt, unter
Rinde, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

Er fand sich in Menge in ausländischem, 1817 nach Schwa-
ben gekommenen Getreide. (*Nördlinger*.) *Gnathoncus cornutus*
s. (*G. ruber* Thunbg. *cucullatus* Montrouz.) (Larve Gernet Hor.
ent. Russ.) wird zuweilen aus Südeuropa mit Getreide verschleppt,
z. B. nach England (*Nördlinger*) und dürfte sich wohl auch in
Baiern noch vorfinden.

568. *Hypophloeus* *Helwig*.

hypo unter, phloios Rinde.

1) *depressus* *Fabr.* 2750.

melinus Herbst. — unicolor Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.

2) *castaneus* *Fabr.* 2751.

picipes *Fabr.* — cimeterius Herbst. — taxicornis *Rossi.* — nitidus *Melsh.* — Zusmarshausen; Augsburg; München, Pullach, Mai, zwischen der Menterschweige und Geiselgasteig an Buchen, August, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschbach ziemlich s. unter Buchenrinde; Aschaffenburg n. s. unter Rinden.

3) *Fraxini* *Kugelann.* 2752.

ferrugineus *Crentz.* — Pini *Zetterst.* — Larve *Perris* *Ann.* Fr. 1857. p. 354. t. 8. f. 430—438. — München; Aschaffenburg s.; im Frankfurter Walde zwei Exemplare unter Kiefernrinde, von *Heyden*.

4) *Pini* *Panz.* 2753.

nocivus *Wollast.* — Augsburg; München; Regensburg s.; Eichstädt.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)