

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

- 20) **nigriceps** Kraatz. 994.
pincti Brisout. — ruficollis Steph. — attenuatus var. 3. Grav.
— maurorufus var. Erichs. — Aschaffenburg; Seligenstadt,
Frankfurt, Darmstadt, Decan Scr. Ist der ächte praecops Grav.
v. Heyden).
- 21) **subturalis** Kiesenw. 995.
Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan
Scr. (Ich kenne nur Wiener- und Pyrennäenstücke, Fundorte bei
Scr. sehr zweifelhaft, v. Heyden).
- 22) **marginalis** Kraatz. 996.
Seligenstadt einzeln, Decan Scr.; Darmstadt, Oberstlieutenant
Klingelhöffer. Ist nach v. Heyden — limbatus Heer. — mauroru-
fus Grav.
- 23) **maurorufus** Grav. 997.
modestus Kraatz. — attenuatus Grav. — praecox Lac. —
acuminatus Fairm. — limbatus Heer. — München; bei Föhring,
April, in der Stadt, Januar, Dr. Kr.; Bamberg, Prof. Hofmann;
Aschaffenburg s.
- 24) **rufipes** Grav. 998.
ruficornis Grav. — attenuatus Lac. — München.
- 25) **monticola** Erichs. 999.
rufipes Redtenb. — paradisiacus Heer. — Babenhausen einige
Stücke, Decan Scr. (Ist ein hochalpines Thier und sicher nicht
bei Babenhausengefunden. Meine als monticola bestimmten Stücke
von Frankfurt sind der ächte Qu. rufipes Grav. = semiobscurus
Marsh. v. Heyden).
- 26) **semiobscurus** Marsh. 1000.
rufipes Erichs. — Aschaffenburg s.
- 27) **semiaeneus** Steph. 1001.
semiobscurus Er. — proximus Kraatz. — myagrus Rottenberg. —
Lauterbach in Oberhessen, seither mit attenuatus vermenget;
v. Heyden.
- 28) **attenuatus** Gyllenh. 1002.
picipennis Heer. — scintellus Lac. — fallaciosus Kraatz. — mau-
rorufus Rund. — nitidipennis Steph. — rufipennis Steph. — Aug-
sburg; München; Freising n. h. Wald bei Wippenhausen, August
in Isargenist, April, Juni; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffen-
burg n. h., besonders in Anspülicht.

- 29) **boops** Grav. 1003.
München; Tegernsee, September, Dr. Kr.; Moosburg Notar v. Sonn.; Nürnberg s.; Erlangen, Aschaffenburg s. in Anspülicht.
- 30) **scintillans** Grav. 1004.
fuscipes Steph. — Larve Perris Ann. Fr. 1853. p. 570. t. 17. f. 37—43. München; Darmstadt s., Oberstlieutenant Klingelhöffer. (Ich kenne nur österreichische und pyrenäische Stücke, v. Heyden).
- 31) **lucidulus** Erichs. 1005.
Ober-Lais einzeln, Decan Scr.; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 32) **chrysurus** Kiesenw. 1006.
microps Grav. — Seligenstadt in Mehrzahl, Ober-Lais einzeln bei Formica fuliginosa, Decan Scr.; Frankfurt, v. Heyden.
- 33) **gracilicornis** Heer. 1007.
picipes Mahnr. — Auf der Gundelalpe in faulen Baumstämmen, August, unter Brettern April, Dr. Kr.
34. **mesometinus** Marsh. 1008.
Soden im Taunus, Bieberich, Frankfurt, v. Heyden; bisher für schwarzflügelige fulgidus gehalten.

172. **Astrapaeus** Gravenhorst.

astrapaios glänzend.

- 1) **Ulni** Rossé. 1009.
rufipennis Steph. — ulmineus Fabr. — München.

D. Staphylinini.

173. **Creophilus** Mannerheim.

kreas Fleisch, philos Freund.

- 1) **maxillosus** Linné. 1010.
annonymus Sulz. — balteatus De Geer. — fasciatus Füssly. — nebulosus Fourer. Larve Chap. et Cand. Mém. Liège. 1853. p. 399. t. 2. f. 1. — Zusmarshausen; Augsburg h., besonders an Aas; München; an der Mauer des Krankenhauses, Juni, Tegernsee, Dr. Kr. Freising h.; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg; Eichstädt; Nürnberg h.; Erlangen; h.; Weiden n. h., Schmidt; Rothenburg, Prof. Dr. Langhans; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. an Aas; Würzburg; Aschaffenburg s. h.

174. **Emus** Curtis.

- 1) **hirtus** Linné. 1011.
bombilius De Heer. — Zusmarshausen; Augsburg s., von Herrn Schwatger in einem Composthaufen auf dem Exercierplatze

gefunden, und in grosser Anzahl aus der Larve gezogen; München; im englischen Garten auf der Strasse, Juni, in Pferdemit auf dem Marsfeld bei Nymphenburg, Mai, Dr. Kr.; Freising n. s., bei der Gaasfabrik, *Ehlerl.*, Mai, Juni, Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Schwandorf und Weiden s., in Rinderkoth, Frühjahr, *Schmidt* Eichstädt; Nürnberg n. h., bei Zeltner's Weiher; Fürth Prof. Dr. *Langhans*; Erlangen; Fichtelgebirg; Reichelheim s. s. Aschaffenburg s.; Dietzenbach in Kuhmist, Decan *Scr.* Frankfurter Wald, *v. Heyden.*

175. *Leistrophus* *Perty.*

leistos räuberisch, trophos Nahrung.

1) *nebulosus* *Fabr.* 1012.

hybridus Marsh. — murinus Harrer. — tessellatus Fourc. — villosus var. De Heer. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München an einer feuchten Stelle oberhalb Hessellohe, Mai, im englischen Garten, April, Georgenschwaige im Walde an Aas, Mai Gündelalpe bei Tegernsee in Kuhdung. August, Dr. Kr. Freising h., in Kuhdung; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg; Dinkelsbühl, September; Nürnberg h., Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h.

2) *murinus* *Linné.* 1013.

Zusmarshausen; Augsburg noch häufiger als der vorige in Kuhdung; München; bei Grünwald, Mai, bei den Uferfällen, Juni, Tegernsee, April, Dr. Kr.; Freising h.; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg; Nürnberg h.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h. Würzburg; Aschaffenburg h.

176. *Staphylinus* *Linné.*

staphilinos Name eines Insektes bei Aristoteles, bei Plinius eine Art Pastinak.

1) *stercorarius* *Oliv.* 1014.

Augsburg s.; München; Tegernsee, September, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Erlangen s.; Aschaffenburg s. s.

2) *chaleocephalus* *Fabr.* 1015.

aeneocephalus Fabr. — fimetarius Ziegl. — ochropterus Germ. carinthiacus Lac. — Zusmarshausen; Augsburg zwei Stück, Prof. *Kuhn*; München, Passau; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Kissingen, Dr. *v. Weidenbach*; Oer-Lais n. s., Decan *Scr.*

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).