

L i t e r a t u r.

Ed. Steinheil. Symbolae ad historiam coleopterorum Argentiniae meridionalis etc. (Atti della soc. ital. di sc. natur. Milano XV. 1873.).

In diesem Verzeichnisse, welches die zweite Centurie der von Prof. Strobel in der Argentinischen Republik gesammelten Käfer umfasst, findet sich manch neue Species, wie u. m. a. *Ataenius Haroldi*, welcher zu jener Gruppe gehört, in welcher das Schild nicht abgerundet, sondern deutliche wenn auch stumpfe Winkel hat; — *Ligyrrus Burmeisteri*, der Form nach an *Lig. juvenus* Fab. erinnernd; — *Cyclocephala metrica* dem *Cycl. laminata* Bur. nahestehend; *Pachypyga undata* n. g. et n. sp. — der *Anthaxia* nahe, ist aber flacher u. von parallelogrammischer Form u. m. a.

Gelehrte Gesellschaften.

Bollettino della società entomologica,

Das 4. Heft 1873 der in der italienischen entomologischen Gesellschaft in Florenz herausgegebenen Zeitschrift, enthält wie gewöhnlich Aufsätze, welche reichliche Beiträge zur Kenntniss der entomologischen Fauna in Italien bringen — da finden wir von H. Ragusa Beschreibung von *Georyssus sicutus* n. sp., welcher dem *G. substriatus* nahe steht, sich aber durch Grösse und Punctirung der Flügel unterscheidet (an den Ufern des Oveto bei Palermo); *Calomicrus Rottenbergi* n. sp., sehr annähernd an *C. pinicola* Duftschm., unterscheidet sich aber von diesem durch kleinere Statur, durch die schwarze Färbung des Thorax und der Füsse und durch die abgerundeten Ecken des Corsalets (Madonie). — Ferners gibt Ragusa manche Bemerkungen über Synonymie; so ist *Haploenemus rufomarginatus* P. identisch mit *Hapl. Koziorowiczii* Desbr. und mit *Hapl. marginatus* Rott.; — *Telophorus puncticollis* Lovr. ist gleich = *Tel. Picciolii* Rag., welche letztere nur eine Varietät von *Tel. haemorrhoidalis* Fab. ist; — *Teleph. rufifrons* de Mars, ist nur eine Varietät von *Tel. fuscipennis* Muls.; — *Omphalus fallaciosus* Rottenb. ist gleich *Om. longicornis* Bert.;