

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

O. Pterostichini.

36. *Pogonus* Dejean.

- 1) *Curidipennis* Germ. 135.
Burelli Curt. — Allgäu, Obergeometer Stark. Aschaffenburg n. h.
- 2) *iridipennis* Nicol. 136.
fulvipennis Dej. — brevicollis Mannerh. — obsoletus Steven
in litt. — Passau.

37. *Patrobus* Dejean.

- 1) *rufipennis* Dej. 137.
Passau.
- 2) *excavatus* Payk. 138.
rufipes Duftschm. — Augsburg; München; am Ufer des
Spitzingsees unter Steinen, August, Wolfrathshausen, Dr. Kr.; Lin-
dau, Professor Petry; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen einzeln
im Frühjahr unter Laub im Eichenwald; im Jahre 1841 unter
Laub und Gras der Brucker Lache s. h.; Aschaffenburg n. h.
- 3) *septentrionis* Dej. 139.
hyperboreus Dej. — alpinus Curtis. — picicornis Zett. — rufipes
var c. Gyllh. — Am Ufer des Bodensees bei Lindau in Mehr-
zahl von Herrn Professor Petry entdeckt.

38. *Cryptotrichus* Schaufuss.

Kryptos verborgen, trix Haar.

- 1) *janthinus* Duftschm. 140.
amethystinus Dej. — Episcopus Drapiez. — Passau.

39. *Sphodrus* Clairville.

- 1) *leucophthalmus* Linné. 141.
planus Fabr. — spiniger Payk. — obsoletus Rossi. — cordi-
collis Motsch. — siculus Motsch. — Ueberall in Kellern und an
dumpfen Orten, in Erlangen vorzüglich bei Bäckern, wo er zur
Nachtszeit in die Zimmer kommt. Er scheint jedoch hier und da
zu fehlen, z. B. bei Augsburg.

40. *Pristonychus* Dejean.

pristes gesägt, onyx Klaue.

- 1) *terricola* Herbst. 142.
 subcaneus Illig. — inaequalis. Panz. — subterraneus Dahl in litt.
 Larve Chap. et Cand. Mem. Liège. 1853. p. 376. t. 1 f. 3. Ueber-
 all in Kellern und an dumpfen Orten n. s., während der wär-
 meren Jahreszeit besonders an Gemüse, aber auch im Freien
 unter Gesträuch, z. B. bei der Solitüd bei Erlangen.

41. *Calathus* Bonelli.

Kalathos Körbchen.

- 1) *cisteloides* Ill. 143.
 flavipes Payk. — frigidus Fabr. — distinguendus Chaud. —
 grandis Motsch. in litt. — latus Brullé. — planipennis Germ. —
 violatus Germ. — nitens Ziegl. in litt. — Ueberall gemein, be-
 sonders in Wäldern.
- 2) *punctipennis* Germ. 144.
 latus Dej. — angusticollis Sturm. — punctulatus Rossi. — testu-
 dinarius Chaud. in litt. — Bei Hanau nach Zebe.
- 3) *circumscriptus* Germ. 145.
 limbatus Dej. — marginellus Sturm. — lateralis Küst. —
 Regensburg s.
- 4) *fulvipes* Gyllh. 146.
 flavipes Fourcroy. — erratus Sahlbg. — ambiguus Payk. (pars.)
 angustatus Ramb. — asturiensis Veuillfr. — crocopus Steph. Ueberall
 g., besonders in Wäldern unter Moos und faulendem Holze.
- 5) *fuscus* Fabr. 147.
 rufipes Fabr. — tardus Fabr. — ambiguus Payk. — rufangulus
 Marsh. — dilutus Chaud. — Chevrolati Gautier. — anceps Ziegl. in
 litt. — badius Ménétr. in litt. — Ueberall u. s.
- 6) *melanocephalus* Linné. 148.
 ochropterus Duft. — apicalis Newm. — nubigena Halid. —
 dubius Motsch. in litt. — Ueberall g.
- 7) *micropterus* Duftschm. 149.
 alpinus Redtenb. — microcephalus Dej. — ♂ elongatus Dej. —
 ♂ glabripennis Sturm. — fascatus Bonelli in litt. — melanocephalus
 var. b. Gyllh. — Augsburg; München; Tegernsee, Dr. Kr.;
 Moosburg, Notar v. Sonn.; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Septem-
 ber; Nürnberg; Erlangen h. im Frühjahr in Wäldern, am liebsten
 unter Moos; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg u. s.

42. *Taphria* Bonelli.

taphreia Graben.

- 1) *vivalis* Panz. 150.
 impigra Panz. — nivalis Panz. — Augsburg; München;

Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen s., im Sommer im Eichen-, Rathsberger- und Tennenloher-Wald; auf Wegen, unter Steinen und Gras; Muggendorf unter Steinen; Aschaffenburg s., Strietwald.

43. *Dolichus Bonelli.*

dolichos lang.

- 1) *flavicornis* Fabr. 151.
München, Passau, Regensburg, Fichtelgebirg, Abach s., *Rösch*.

44. *Anchomenus Erichson.*

ancho die Kehle einschnüren, wegen des verengten Halsschildes.

Platynus Bonelli.

platineuo ich breite aus.

- 1) *angusticollis* Fabr. 152.
juncens Scopol. — *assimilis* Payk. — Ueberall häufig, besonders in Wäldern.
- 2) *tivens* Gyllh. 153.
bipunctatus Sturm. — *mundus* Germ. — *memnonius* Nicol. depressus Motsch. in litt. — Passau; Erlangen; *Küster*; Offenbach ein Stück, *v. Heyden*.
- 3) *prasinus* Fabr. 154.
dorsalis Müller. — *viridis* Linné. — *viridanus* Oliv. — *marchicus* Herbst. — *bicolor* Fourc. — *cyanicollis* Gebl. — Ueberall häufig.
- 4) *albipes* Fabr. 155.
pallipes Fabr. — *pavidus* Panz. — *antennatus* Gautier. — *sordidus* Steph. — Besonders an Flussufern und feuchten Orten u. s., gerne unter Steinen.
- 5) *oblongus* Fabr. 156.
obscurus Herbst. — *taeniatus* Payk. — *pallidulus* Chaud. — Ueberall n. s. s., besonders unter faulendem Laub, in alten Stöcken und im Gras.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer** jun.

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).