

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

B. *Agonum Bonelli.*

a nicht, gonia Ecke, wegen des runden Halsschildes.

- 6) ***marginatus* Linné.** 157.
agrorum Fourcr. — An Flussufern n. s.
- 7) ***impressus* Panz.** 158.
Augsburg s., Lechufer am Spickel; München; auf dem Sande des Jsarufers unterhalb der Bogenhauser Brücke, Mai, Dr. Kr.; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Erlangen, Küster; Frankfurt einzeln, v. Heyden; in Rheinanspüllicht, Obristlieutenant Klingelhöffer.
- 8) ***sexpunctatus* Linné.** 159.
duodecimpunctatus Müller. Ueberall g.
- 9) ***ericeti* Panz.** 160.
bifoveolatus Sahlb. — fulgens Davis. — sexpunctatus var. Gyllh. — metallicus Mannerh. in litt. — Erlangen s. s.
- 10) ***parumpunctatus* Fabr.** 161.
clandestinus Sturm. — Mülleri Herbst. — laevis Daws. — plicaticollis Nicolai. — Ueberall g. — var. tibialis Ziegl. — München; Nürnberg. — var. Melleti Heer. — München.
- 11) ***gracilipes* Duftschm.** 162.
elongatus Fisch. — thoracicus Fisch. — parvicollis Ziegl. in litt. — productus Gebl. — Augsburg, Professor Kuhn; München; Regensburg, Nürnberg s.; Erlangen s. s., Rathberger Wald im Frühjahr; Seligenstadt ein Stück, Decan Scr.; zwischen Ems und Reichenau unter Steinen, März, April, Dr. Kr.
- 12) ***austriacus* Fabr.** 163.
nigricornis Panz. — München; Wolfrathshausen, Dr. Kr.; Regensburg; Erlangen, Küster; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingelhöffer. — var. modestus Sturm. — Regensburg, Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Erlangen h. das ganze Jahr hindurch auf Wiesen unter Steinen, auch auf dem Hetzles; Fränkische Schweiz, Dr. Rosenhauer; Breitbach etwas s., auf feuchten moorigen Wiesen; Darmstadt, Decan Scr.
- 13) ***lugens* Duftschm.** 164.
München; Regensburg s.; Erlangen s. s., im Tennenloher und Eichenwald, im Juli unter Laub; Darmstadt, im Moos von Kieferwäldungen, stud. Weis.

- 14) **viduus** Panz. 165.
 obscurus Payk. — vernalis Payk. — Augsburg; München, am Wege nach Föhring, Mai, an der Isar bei Bogenhausen, Juli, Dr. Kr.; Freising h., im Herbst unter Laub, Weißenstephan; Wald bei Wippenhausen, Mai; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg n. g.; Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen die gemeinste der schwarzen Arten; Steigerwald, n. h.; Aschaffenburg s., an dumpfen Waldstellen. — var. moestus Duftschm. — Augsburg; Moosburg, Notar v. Sonn.; Regensburg n. g.; Erlangen n. h., im Tennenloher und Eichenwald im Gras an feuchten Stellen; Ebrach s. an feuchten Stellen. — var. lugubris Dej. — München. — var. emarginatus Gyllh. — München.
- 15) **versutus** Sturm. 166.
 lugubris Duft. — laevis Dej. — longipennis Chaud. — aheneus Fisch. in litt. — nitidulus Megerle in litt. — München; Passau; Erlangen s., in den Wäldern im Sommer und im Winter, und in der Brucker Lache; Steigerwald s. auf Wiesen; Aschaffenburg s.
- 16) **antennarius** Duftschm. 167.
 subaeneus Dej. — crenatus Latr. — subcyaneus Sturm. — discopunctatus Dahl in litt. — Erlangen s., Brucker Lache im Sommer unter Laub.
- 17) **atratus** Duftschm. 168.
 monachus Duftschm. — lateralis Redtenb. — niger Dej. — lucidus Fairm. — Menetriesi Fald. — München.
- 18) **micans** Nicolai. 169.
 pelidnus Duftschm. — inauratus Eschsch. — cursor Steph. München; Freising n. s., in Isargenist, September; am Isarufer unter abfallendem Laub, März, Pförer Au, an Populus-Stämmen, April; Passau; Erlangen s., im Rathsberger und Tennenloher Wald unter Steinen und im Gras im Sommer; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan Scr.
- 19) **piceus** Linné. 170.
 picipes Fabr. — lutescens Panz. — fuscipennis Nicolai. — canelipes Mötsch. — München; Erlangen, nur einige Exemplare in der Brucker Lache; in Rheingenist, Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 20) **gracilis** Sturm. 171.
 atratus Steph. — picipes var. b. Gyllh. — München; Allgäu, Obergeometer Stark; Nürnberg n. s., am Ufer des Dutzenteiches zwischen Gras herumlaufend, Erlangen, nur drei Stück in der Brucker Lache in Gras; Frankfurt, v. Heyden.
- 21) **fuliginosus** Panz. 172.
 brunnipes Dej. — putridus Zetterst. — convexus Gebl. — gracilis Steph. — pullus Steph. — pusillus Steph. — quadripunctatus Steph. — Simpsoni Steph. — striatus Steph. — München; Nürnberg; Erlangen; h. in der Brucker Lache, s. s. auf dem Rathsberge; Ebrach s. s.; Frankfurt; Darmstadt, Ober. Lais, n. h., Decan Scriba.

22) **puellus** Dej. 173.

pelidnus Payk. — Lehmanni Chaud. — longicollis Boisd. et Lac. — longulus Motsch. — chalybaeus Stéven in litt. — affinis Steph. — München; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan Scr.; Frankfurt, v. H.; am Rhein, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

23) **Thoreyi** Dej. 174.

pelidnus Steph. — Darmstadt, am grossen Woog, Dr. *Nebel*; in Rheingenist, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

24) **quadripunctatus** De Geer. 175.

cupratus Sturm. — foveolatus Illig. — foveipennis Chaud. in litt. — Nürnberg s. s.; Frankfurt unter Platanus-Rinde, v. *Heyden*, in Rheingenist einige Mal gefunden, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

45. **Olisthopus** Dejean.

olisthos Schlüpfrigkeit, pus Fuss.

1) **rotundatus** Payk. 176.

vafer Duftsch. — rotundicollis Marsh. — Zusmarshausen; Augsburg; München, an der Nymphenburger Gartenmauer, Juli, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s. s., Nürnberg; Erlangen, besonders im Eichenwald bei Buckenhof im Sommer; Aschbach s. h.; Muggendorf unter Steinen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Holzberndorf 1842—43 unter Steinen h., sonst s., Dr. *Kress*, Kissingen n. h., Aschaffenburg n. s., im Frühjahr unter Steinen.

2) **glabricollis** Germ. 177.

punctulatus Dej. — rotundicollis Sturm. — gracilipes Duft. — München.

3) **Sturmi** Dej. 178.

flavipes Panz. — rotundicollis Fairm. et Lab. — Augsburg; München; Nürnberg s.

46. **Stomis** Clairville.

stomys Mund.

1) **punicatus** Panz. 179.

Augsburg; München; Wolfrathshausen, Dr. *Kr.*; Freising s., im Isargenist, April; Weihenstephan im Mai, Juli; Moosburg Notar v. *Sonn*.; Passau, Regensburg s.; Dinkelsbühl n. s. Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen s. s., im Frühlinge auf dem Hetzles, im Sommer an feuchten Stellen in Gras der Brucker Lache; Eb-rach u. Aschbach n. s., auf Wiesen unter Steinen; Aschaffenburg h.

47. **Platyderus** Stephens.

platys breit, dere Hals.

1) **rufus** Duft. 180.

München, Erlangen, ein Paar Exemplare im Frühjahre auf dem Hetzles.

48. *Pocilus Bonelli*.

poikilos bunt.

1) *punctulatus* Fabr. 181.

laevigatus Dufour. — Regensburg s.; zwischen Regensburg und Donaustauf, August, Dr. *Kr.*; Nürnberg s.; Erlangen, ein Exemplar in der Nähe der Stadt, Kupferstecher *Bruch*; Altorf s.; Aschbach und Ebrach je ein Exemplar unter Steinen; Aschaffenburg s. s.

2) *cupreus* Linné. 182.

metallicus Scopol. — Ueberall g. — var. *coerulescens* Linné. — München; Nürnberg. — var. *versicolor* Sturm. — München, an der Isar bei Bogenhausen, Mai; bei Harlaching Mai, bei Tegernsee, August, zwischen Kriml und Mittersill, September, Dr. *Kr.*; Nürnberg in Pegnitzgenist, August 1870. — var. *cursitans* Dej. — München; Steigerwald ein Exemplar Dr. *Kress*. — var. *medius* Meg. — München, an der Gartenmauer bei Nymphenburg durch Aufgraben des Bodens, Mai, Dr. *Kr.* — var. *affinis* Sturm. — *erythropus* Fald. — *ruffemorus* Steph. — *fulvipes* Ménétr. in litt. — *viridis* Motsch. in litt. — München; Erlangen s.

3) *dimidiatus* Oliv. 183.

tricolor Fabr. — Kugelanni Panz. — Augsburg, Rosenauberg ein Exemplar unter einem Steine gefunden, *Otto Roger*; München, Passau; Aschaffenburg n. s.; Darmstadt; Giessen, *Laubenheimer*.

4) *Koyi* Germ. 184.

viaticus Dej. — Passau.

5) *lepidus* Fabr. 185.

gressorius Dej. — vulgaris Scopol. — virens Müll. — fulgidus Motsch. — lucidus Falderm. in litt. — Ueberall g. — var. *coerulescens* Herbst. — München; Nürnberg n. s. — var. *transalpinus* Heer. — München.

6) *subcoeruleus* Schönh. 186.

coerulescens Sturm. — striatopunctatus Duft. — numidicus Luc. — crenulatus Dahl. in litt. — virens Ahrens in litt. — Zusmarshausen; Augsburg, mehrfach gefunden, Professor *Kühn*; München.

49. *Argutor Megerle*.A. *Lagarus Chaudoir*.1) *vernalis* Panz. 187.

crenatus Duft. — rotundicollis Sturm. — biimpressus Fuss. — clancularis Eschsch. in litt. — rufomarginatus Curt. — inquinatus Steph. — Ueberall n. s., besonders in Wäldern unter Moos, und in Wiesen; er überwintert.

2) *inaequalis* Marsh. 188.

negligens Dej. — longicollis Duft. — ochraceus Sturm. — Scalesii Steph. — Augsburg, *Gscheidlen*; Erlangen, auf einem

Felde des Hetzles, besonders im Frühling unter Steinen, oft ziemlich tief in der Erde; Muggendorf ein Exemplar, Professor Dr. *Rosenhauer*; Aschbach, mehrere Stücke unter Steinen; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt, von *Heyden*.

B. *Argutor* Megerle.

3) *ovoideus* Sturm. 189.

eruditus Dej. — interstinctus Sturm. — strenuus Duft. — München; Immenstadt, Oberg. *Stark*; Tegernsee, April, Dr. *Kr.*; Erlangen s., in der Brucker Lache an feuchten Stellen in Gras, auf dem Hetzles unter Steinen einzelne; Aschaffenburg n. s.

4) *strenuus* Panz. 190.

erythropus Marsch. — intermedius Dej. — diligens Dej. — nigriceps Sturm. — pygmaeus Sturm. — solers Sturm. — gagates Duft. — difficilis Chaud. — interstinctus Steph. — August; München; in der Au, Mai, Dr. *Kr.*; Tegernsee, Dr. *Kr.*; Freising in Isargenist, April; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Regensburg n. g.; Erlangen im Juli auf feuchten Stellen unter Steinen auf dem Rathsberge, in der Brucker Lache in Gras ziemlich h.; Steigerwald n. s., an feuchten Orten unter Steinen. — var. pullus Gyllh. — München.

5) *diligens* Sturm. 191.

Heyeri Sturm. — politus Heer. — rotundicollis Duft. — strenuus Er. — ♀ maeoticus Motsch. — Augsburg, *Gscheidlen*; München; Freising n. s., Wald bei Thalhausen, April und November, in Isargenist, April; bei Martzling, Juli; Regensburg n. g.; Nürnberg; Erlangen zu gleicher Zeit und an derselben Stelle wie *strenuus*, jedoch etwas seltener.

C. *Haptoderus* Chaudoir.

6) *unctulatus* Duft. 192.

alpestris Heer. — München; Allgäu, Obergemeter *Stark*; am Wege zu den Niederalpen in Tegernsee, August, Dr. *Kr.*

7) *spadiceus* Dej. 193.

nanus Heer. — planus Jenisson. — Immenstadt, Obergemeter *Stark*.

50. *Omaseus* Ziegler.

omos räuberisch.

A. *Omaseus* Ziegler.

1) *vulgaris* Linné. 194.

affinis Steph. — melanarius Illig. — leucophthalmus Fabr. (Feronia). — sulcatus Steph. — Augsburg g.; München, Starnberg; Juni, Tegernsee, Septbr., am Bache bei der Königsalpe unter einem Brett August, Dr. *Kr.*; Freising g., in Wäldern; Moosburg, Notar

v. Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen an feuchten Stellen unter Steinen überall g.; Muggendorf; Oettingen h. im Hirschpark, September; Steigerwald g.; Weiden h. in Feldern, vom Frühjahr bis zum Herbst, *Schmidt*; Würzburg; Aschaffenburg n. s. — var. leucophthalmus Dahl. — München. — var. nemoralis Latr. — München.

2) *melus* *Creutz.* 195.

maurus Sturm. — Augsburg; München; am Wege nach Harlaching, Juni, Planeck, Mai, Grünwald, Mai, an der Nymphenburger Gartenmauer unter Laub und Sand Mai; Tegernsee, Juni, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg n. g.; Nürnberg; Erlangen im Frühling und Sommer an den Steinbrüchen auf dem Hetzles g; Steigerwald h.; Friedberg in der Wetterau, Decan *Scr.* — var. depressus Ziegl. in litt. — München.

3) *nigrita* *Fabr.* 199.

confluens Panz. — hortulanus Kugelann in litt. — Augsburg; München, im englischen Garten, April, im Hirschgarten, Mai; oberhalb der Reichenbacher Brücke, Mai, am Ufer des Spitzingsee unter Steinen, August, Dr. *Kr.* Moosburg, Notar *von Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen s. g., besonders auf Wiesen das ganze Jahr hindurch, Fichtelgebirg; Steigerwald s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.

4) *anthracinus* *Illig.* 197.

maurus Fabr. — nigritus Panz. — biimpessus Küst. — Augsburg; München; Tegernsee, Mai; am Ufer des Amersees bei Stögen, Juli, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar *von Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg, in Pegnitzgenist, August, Schmausenbuck, September; Erlangen mit dem vorigen, jedoch selten; Aschaffenburg s.

5) *gracilis* *Dej.* 198.

Güntheri Sturm. — tetricus Curtis. — rotundicollis Steph. — München; Freising ziemlich s., Wald bei Wippenhausen, Mai; Regensburg g.; Nürnberg, in Pegnitzgenist, August; Erlangen, wie die vorhergehenden, jedoch mehr in Wäldern, ziemlich s.; Aschaffenburg n. h.

6) *minor* *Gyllh.* 199.

anthracinus Gyllh. — brunneus Sturm. — badius Sturm. — laevigatus Steph. — Augsburg; München; Regensburg n. g., Nürnberg; Erlangen nur im Sommer im Rathsberger Walde unter Steinen, im Tennenloher Walde an feuchten Stellen (Brucker Lache) im Grase ziemlich h.; Aschaffenburg n. h.

B. *Lyperus* *Chaudoir.*

7) *aterrimus* *Payk.* 200.

vulgaris var. Linné. — München, im englischen Garten an künstlichen Felspartien; Freising; Moosburg, Notar *von Sonn.*; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen ein Exemplar am 20. Februar 1839, in der Ecke nächst dem Schutzdamme am Sandberge unter dem Angeschwemnten; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer.*

51. *Steropus Megerle.*

steros fest, pus Fuss.

1) *madidus* Fabr. 201.

humidus Sturm. — arrogans Steph. — München. — var. concinnus Sturm. — Augsburg, *Gscheidlen*; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen s. s., im Eichenwald, im Sommer auf dem Rathsberge unter Steinen und Laub; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Kissingen s., *Rösch*; Aschaffenburg s., Schmerlenbacher- und Strietwald.

2) *aethiops* Panz. 202.

concinnus Curtis. — cognatus Steph. — maurusiacus Mannerh. — obtusus Mannerh. in litt. — frater Schneider in litt. — München; auf dem Kühzagal bei Tegernsee in einem faulen Baumstamme in grosser Menge, September, Dr. *Kr.*; Allgäu Obergeometer *Stark*; Passau; Regensburg s. s.; Erlangen; bei Aschbach von Herrn Landarzt *Kress* gefangen. Der Käfer ist im Winter in Stöcken von *Fagus silvatica* h.; Winkelhof h.; in faulenden Eichenstämmen, Dr. *Kress*.

52. *Platysma Bonelli.*

platysma Ebene.

A. *Adelosia Stephens.*1) *picimanum* Duftschm. 203.

monticola Nicolai. — macrum Steph. — moestum Stéven in litt. — siagonicum Ménétr. — sibiricum Gebl. — München; Freising; Moosburg, Notar *von Sonn.*; Nürnberg; Erlangen, Hetzles unter Steinen und Holz das ganze Jahr hindurch h., einmal bei ausgetretenem Wasser auf Wiesen bei Erlangen; Fränkische Schweiz; Wassertrüdingen, Professor *Hoffmann*; Friedberg, Decan *Src*.

B. *Bothriopterus Chaudoir.*2) *oblongopunctatum* Fabr. 204.

hafniense Linné. — octopunctatum Steph. — cicatricosum Besser in litt. — Ueberall g., besonders in Wäldern unter Moos und Steinen oder in alten Stöcken.

3) *angustatum* Duftschm. 205.

anthracinum Sturm. — München; Nürnberg; Erlangen s., nur im Tennenloher- und Rathsberger-Walde; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.

53. *Pterostichus Bonelli.*

pteron Flügel, stix, Reihe.

1) *niger* Schaller. 206.

clavipes Scriba. — leucophthalmus Panz. — Frischi Herbst. — striatus Payk. — nigrostriatus De Geer. — Ueberall n. s., besonders in alten Stöcken und an feuchten Stellen der Wälder.

- 2) **Kokeili** Müll. 207.
alpinus Ahr. in litt. — Gastein.
- 3) **maurus** Duftschm. 208.
morio Duftschm. — planus Sturm. — sordidus Sturm. — madidus Sturm. — conformis Sturm. — bilineatopunctatus Dahl. — bilineipunctatus Peiroleri in litt. — biseriatus Germar in litt. — parnassus Bonell. in litt. — Passau; Nürnberg.
- 4) **Jurinei** Panz. 209.
Clairvillei Sturm. — Anderschi Dahl in litt. — chloromelas Ziegl. in litt. — Immenstadt, Obergemeter Stark; Passau.
- 5) **multipunctatus** Dej. 210.
Immenstadt, Obergemeter Stark; den 13. August 1855 von der obersten Hütte des Wallberges zur Schneid (oberste Kante) in 14 Exemplaren erbeutet, Dr. Kr.
- 6) **fasciatopunctatus** Creutz. 211.
brevis Ziegl. in litt. — München; Tegernsee am Abbach, zwischen dem Paradies und dem Hongposser unter Steinen und Brettern, Mai, Dr. Kr.; Immenstadt, Obergemeter Stark; Passau. var. striatopunctatus Ulrich. — München.
- 7) **Panzeri** Panz. 212.
rugulosus Heer. — Allgäu, Obergemeter Stark.
- 8) **metallicus** Fabr. 213.
Zusmarshausen; Augsburg; München; den 13. August 1855 von den obersten Hütten des Wallberges zur Schneid (obersten Kante) 2 Exemplare, zwischen Harlaching und Geiselnsteig unter Moos, Mai; Tegernsee, Mai; Berchtesgaden, September, Dr. Kr.; Freising; Moosburg Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Dinkelsbühl n. s. Pfarrer Wolff; Nürnberg n. s. Schmausenbuck; Erlangen s. s., in den Wäldern bei Rathsbirg, auf dem Hetzles und bei Egloffstein im Frühling unter Steinen; Fichtelgebirg; Steigerwald h. in Wäldern; Aschaffenburg s.

54. **Abax** Bonelli.

a b a x Bauch, Unterleib.

- 1) **striola** Fabr. 214.
depressus Oliv. — clavipes Bergstr. — Ueberall h., besonders in Wäldern an feuchten Stellen unter Steinen und in Stöcken. — var. parallelepipedus Dej. — München.
- 2) **carinatus** Duft. 215.
Zusmarshausen; München; Moosburg, Notar von Sonn.; — var. porcatu Duft. — München; Tegernsee, April, Dr. Kr.
- 3) **ovalis** Duft. 216.
platys Herbst. — platysma Hofmsgg. in litt. — frigidus Fairm. et Lab. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Tegernsee

September, Dr. Kr.; Passau; Nürnberg; Erlangen s. s., im Frühjahr auf dem Hetzles unter Baumrinden; Aschaffenburg h.

4) *parallelus* Duft.

saxatilis Germ. — quadricollis Lec. — fossula Knoch in litt. Ueberall h.

55. *Molops Bonelli*.

molos Last, ops Ansehen.

1) *elata* Fabr. 218.

gagates Panz. — Ueberall n. s. s. — var. *alpestris* Dej. — München.

2) *terricola* Fabr. 219.

picea Panz. — madida Payk. — ♀ *subtruncata* Chaud. — Ueberall n. s. — var. *brunnipes* Megerle in litt. — München. — var. *montana* Heer. — München.

56. *Amara Bonelli*.

a nicht, mairo ich glänze.

1) *lepida* Zimmerm. 220.

Erlangen im Rathsberger Walde einmal.

2) *tricuspidata* Dej. 221.

München; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg s.; Erlangen s. s., in der Nähe der Stadt von Gras mit dem Schöpfer geschöpft; Aschbach s. s., Kress; Aschaffenburg s., Schönbusch.

3) *strenua* Erichs. 222.

vectensis Daws. — Erlangen s. s., auf dem Hetzles im Frühjahr mit den nächsten Arten; Seligenstadt; Decan Scr.

4) *plebeja* Gyllh. 223.

lenticularis Schiödt. — cylindrella Schiödt. — lapidicola Heer. — varicolor Heer. — nitida Steph. — Augsburg; München; Freising n. h., Xaverienthal Juni; Wiesenwald, Juli; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen n. h., im Rathsberger Walde und auf dem Hetzles; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.

5) *similiata* Gyllh. 224.

constans Germ. in litt. — obsoleta Duft. — praetermissa Sahlbg. — depressa Letzn. — fulvicornis Gysselen in litt. — misera Herrich-Schäff. in litt. — Augsburg; München; an der Isar bei Bogenhausen, Mai, Nymphenburg Juni, Planeck, Mai, Menter-schweige am Fuss der Bäume unter Moss, März, Dr. Kr.; Freising s., Wald bei der Plantage im Moos, Oktober; Moosburg Notar von Sonn.; Passau; Nürnberg Herrnhütte, September; Erlangen s. auf Wiesen, im Winter unter Moos.

6) *ovata* Fabr. 225.

obsoleta Dej. — laevigata Dej. — pratensis Sturm. — trivialis Duft. — subaenea Steph. — anachoreta Ziegler in litt. — Augs-

burg; München, Strasse nach Thalkirchen, April, Weg nach Föhring, April, Dr. *Kr.*; Allgäu Obergeometer *Stark*; Freising s. Wald bei der Plantage unter Moos, Oktober; Moosburg, Notar *von Sonn.*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Erlangen s. s., auf dem Hetzles unter Steinen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s. — var. *agrestis* Megerle in litt. — München. — var. *chlorophana* Megerle in litt. — München.

Nördlinger beobachtete, dass dieser Käfer die Samen von *Reseda luteola* verzehrte; auch fand er ihn mit dem Anbeissen einer Repsschote und mit dem Verzehren der Früchte von *Cynosurus cristatus* beschäftigt. Er tödtet auch andere Käfer und verzehrt dieselben.

7) *montivaga* Sturm. 226.

brevicollis Sturm. — *communis* Fabr. — *ovata* var. Dej. — München, Hirschgarten, Nymphenburg, Mai, Marsfeld, Mai, Dr. *Kr.*; Tegernsee, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg im Penitzgenist, August 1870; Erlangen, nur auf Wiesen in der Nähe der Stadt, vorzüglich bei hohem Wasser ziemlich h.; Frankfurt, *von Heyden*.

8) *nitida* Sturm. 227.

micans Sturm. — *formosa* Schiödte. — Augsburg; München; Tegernsee, März, April, Dr. *Kr.*; Seligenstadt, Decan *Scr.*

9) *communis* Panz. 228.

nitida Dej. — *vagabunda* Duft. — *vulgaris* Daws. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Isargenist bei Bogenhausen, August, Weg nach Föhring, April, Dr. *Kr.*; Freising, in Isargenist, April; Moosburg, Notar *von Sonn.*; Eichstädt; Nürnberg; in Pegnitzgenist, August; Erlangen h., vom Frühjahr bis Spätherbst auf Wiesen, Wegen und in Gärten; Fichtelgebirge; Steigerwald g.; Aschaffenburg n. h. — var. *ferrea* Sturm. — München. — var. *atrocoerulea* Sturm. — München.

10) *lunicollis* Schiödte. 229.

limbata Schiödte. — *vulgaris* Panz. — *pociloides* Heer. — Zusmarshausen; München; Marsfeld, Mai, Weg nach Föhring, April, Dr. *Kr.*; Allgäu, Obergeometer *Stark.*; Freising s., am Ziegelthale, Mai, Wald bei Wippenhausen, Juli, Nürnberg; Erlangen auf Wiesen und in Gärten unter Steinen und auf niederem Gesträuch wie *trivialis*, aber nicht so h.; Steigerwald h.; Aschaffenburg.

11) *curta* Dej. 230.

brunnicornis Heer. — *despecta* Sahlbg. — *aeruginosa* Kolenat. — *viridana* Motsch in litt. — Augsburg; München; Mai, Juni, Dr. *Kr.*; Allgäu, Obergeometer *Stark.*; Regensburg n. s.; Friedberg n. s., Decan *Scr.*

12) *trivialis* Gyllh. 231.

vulgaris Müll. — *Persica* Chaud. — *atra* Steph. — Zusmarshausen; Augsburg g. bei Leitershofen; Oettingen, August; München; Strasse nach Thalkirchen, April, Pullach, Mai, Bogenhausen, April, Dr. *Kr.*; Freising h., Wald bei der Wiesenkirche und der Plantage; Weihestephan; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg h., in Pegnitzgenist, August; Erlangen eine der ge-

meinsten Amaren, überwintert in Moos; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h.

13) *spreta* Dej. 232.

München; Nürnberg s.; Erlangen s. mit dem vorigen, Aschaffenburg s. h.

14) *acuminata* Payk. 233.

vulgaris Fabr. — eurynota Panz. — dilatata Ziegl. — aerata Steph. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Hirschgarten, Nymphenburg, Mai, Dr. *Kr.*; Freising, Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen s., auf dem Hetzles und bei Egloffstein.

15) *familiaris* Duftschm. 234.

lapidicola Kolenat. — lucida Steph. — gilvipes Megerle in litt. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Marsfeld, Mai Dr. *Kr.*; Tegernsee, Dr. *Kr.*; Freising g.; Moosburg Notar *von Sonn.*; Passau; Regensburg g.; zwischen Regensburg und Donaustauf, August, Dr. *Kr.* Nürnberg g., in Menge in Pegnitzgenist, August, Wäldchen bei der Herrnhütte, August; Erlangen, findet sich zugleich mit communis h. und überwintert; zwischen Bamberg und Würzburg, September, Dr. *Kr.*; Steigerwald g.; Aschaffenburg g. — var. atrata Heer. — München. — var. cursor Sturm. — München, Passau. — var. laevis Sturm. — München; Nürnberg auf Wiesen vor der Stadt von Dr. *Sturm* gefunden. — var. lucida And. — München.

16) *lucida* Duft. 235.

infima Steph. — erythropus Steph. — familiaris var. Dej. — Augsburg; München; Nürnberg in Pegnitzgenist, August 1870; Erlangen im Jahre 1841 auf dem Sandsberge unter Ginster gefunden s. s.; Würzburg, April, *Bergmann*; Aschaffenburg n. h. — var. gemina Zimmerm. — München; Regensburg s.; zwischen Ems und Reichenau unter Steinen, April, Dr. *Kr.*

17) *tibialis* Payk. 236.

viridis Duft. — München; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen ziemlich s., im Sommer unter Moos und Calluna vulgaris an trocknen Stellen des Buckenhofer- und Tennenloher Waldes, auch im Winter unter Moos; Steigerwald n. h.; Kissingen, Dr. *v. Weidenbach*; Aschaffenburg s.

(Fortsetzung folgt.)