

Korrespondenz-Blatt

des

zoologisch-mineralogischen Vereines

in

Regensburg.

Nr. 6.

9. Jahrgang.

1855.

Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von

O. Hofmann Stud. Med., und Dr. Herrich-Schäffer.

(Fortsetzung.)

1096. * *Pactolana* Khlw. Um Fichten bei Gebraching, Stauf, Weinting. Mai, Juni.

1097. *Cosmophorana* Tr. Selten; an jungen Föhrentrieben bei Tremelhausen, Eulsbrunn, Stauf. Mai, Juni. O. Hfm.

1098. *Scopariana* HS. (*Lathyrana* Top.) Häufig; in Schlägen. Mai.

30. *Syndemis* HV.

1099. * *Vacciniana* Tisch. Selten; in den Thälern hinter Stauf, Gebraching, Harthof; um blühende Berberis.

1100. * *Ericetana* Zell. Selten; an Birken bei Grass, Weinting und Gebraching. Ende Mai.

1101. *Cuphana* Tr. Häufig; auf Wiesen. Mai, August.

1102. *Quadrana* H. Selten; einmal bei Tegernheim. Mai.

31. *Steganoptycha* Sth.

1103. * *Freyeriana* FR. Einmal bei Donaustauf Ende Juni. O. Hfm.

1104. *Campoliliana* Tr. Nicht selten; bei Weinting, Grass, Wörth. Mai, Juni; an Saalweiden.

1105. * *Immundana* Tisch. Bei Weinting und Gebraching an Erlen. Mai.

1106. *Ramana* L. Bei Weinting und Gebraching. Juli, August.
 1107. *Siliceana* H. Ueberall häufig an Espenstämmen. Juli.
 1108. **Granitana* FR. Sehr selten; bei Weinting und Stauf an Fichten. Juni.
 1109. *Naevana* H. Ende Juni bis August. Häufig um Heidelbeeren, besonders nördlich von Stauf und an der Nordseite des Mittelberges; nur die kleinen grauen Exemplare.
 1110. **Abiegnana* FR. An Fichten bei Grass, Weinting und Kleinprüfening. Ende April, Anfang Mai.
 1111. *Pygmaeana* H. Wie vorige.
 1112. *Frutetana* H. Gemein in Erlengebüsch. Mai.
 1113. **Rubiginosana* FR. Nur einmal.
 1114. *Penkleriana* WV. Gemein um Erlen. Mai bis Anfang August.
 1115. *Minutana* H. Schwabelweisser Berge. Anfang August.
 1116. **Lithoxylana* Fröhl. Einmal im Weintinger Holz gefangen. Juli. O. Hfm.
 1117. **Segmentana* Khlw. Am östlichen Abhange des Mittelberges. Mai, Juni. HS.

32. *Phoxopteryx* Tr.

1118. *Tineana* H. Fast in allen Birkenschlägen, doch nur einzeln. Mai bis August.
 1119. *Mitterpacheriana* WV. Nicht selten. Um Eichen; Gebraching, Mai. HS.
 1120. *Derasana* H. Selten. Mai, August.
 1121. *Badiana* WV. Nicht selten, in Schlägen. Mai bis August.
 1122. *Myrtillana* Tr. Gemein, an Haide bei Grass, Stauf und Lappersdorf. Mai.
 1123. **Comptana* Fröhl. Gemein an den Schwabelweisser Bergen. Ende April, Mai bis Juli.
 1124. *Unguicana* F. Gemein in Schlägen mit Haide. Mai, Juni.
 1125. *Uncana* WV. Nicht selten in Birkenschlägen. April bis Juni.
 1126. **Fluctigerana* FR. In Birkenschlägen bei Grass, Weinting, Gebraching. Ende Mai, Juni.
 1127. *Cuspidana* Tr. Selten, in Birkenschlägen bei Grass und Weinting. Mai, Juni.

1128. **Harpana* H. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Mai, Juni.
 1129. *Siculana* H. Gemein, an Bergabhängen. Mai, Juli.

Canephorina.

315. *Fumea* Haw.

1130. *Bombycella* WV. Selten; an den Schwabelweisser Bergen und am Mittelberg. Juni. Im Frühling gelang uns die Zucht aus den im Grase lebenden Säcken, welche ähnlich denen der *Pulla* gebildet sind, nur grösser, das Weib ist fuss- und fühllos. Hfm.
 1131. *Pulla* Esp. Nicht selten; am Mittelberg, im Weintinger Holz und im Laberthale. Mai, Juni.
 1132. **Sieboldii* Reutti? In Menge aus Säcken, welche von E. Hofmann auf einer Waldwiese bei Wörth gesammelt wurden. Der im April in Menge entwickelte Schmetterling zeigt die in meiner Syst. Bearb. pg. 61 angegebenen Unterschiede.

316. *Epichnopteryx* HV.

1133. **Plumella* WV. Bei Lappersdorf Ende Mai; auf dem Bruderwörth. O. Hfm. erzog die Art bei Regensburg aus einem der *Pectinella* ähnlichen Sack. Er sah die männliche Puppenhülse aus dem Sack hervortreten, das Weib ist wahrscheinlich fusslos, in welchem Falle dann die Art eine *Fumea* ist.
 1134. *Nitidella* H. Nicht selten, bei Weinting und Tegernheim; man klopft die Säcke häufig von Laubholz (Haseln). Das Weib entwickelt sich im Juni, der Mann im Juli.
 1135. **Sepium* Zell. Die Säcke klopften wir häufig im September und Mai von Fichtenflechten bei Weinting, Gebraching, Etterzhausen. Entwicklung Ende Juni. Hfm.
 1136. **Betulina* Zell. Wir fanden die Säcke nicht selten im Weintinger Holz im Juni an Birkenstämmen, von deren

Flechten sie leben; es schlüpften erst 1855 Anfang Juli Männer. Hfm.

Tineina.

Anm. Da die Zahl der hier aufgezählten Arten im Vergleich zu jenen in der Topographie verzeichneten höchst bedeutend geworden ist, dort auch mehrere Arten irrthümlich als Regensburgisch aufgeführt waren, so bleibt von hier an der Stern (*) weg.

317. *Lypusa* Zell.

1137. *Maurella* WV. Selten und einzeln bei Stauf, Kleinprüfening, Wörth Im Mai. O. Hfm. entdeckte den Sack am Keilstein, er ist aus einem Blatte zusammengerollt, fast cylindrisch, wenig gekrümmt, die Blattrippen bilden convexe Ringe vor und hinter der Mitte.

318. *Scardia* Tr.

1138. *Choragella* WV. Selten, östlich vom Mittelberg.

320. *Incurvaria* Haw.

1139. *Mascullella* H. Nicht häufig; bei Stauf und Weinting. Mai.

1140. *Zinckenii* Zell. Um Birken.

1141. *Oehlmanniella* Tr. Einzeln, Juni.

1142. *Koerneriella* Zell. Selten; bei Etterzhausen. Mai.

321. *Tinea* L.

1143. *Tapetiella* L. Im Juni in Häusern.

1144. *Arcella* F. Am Fuss des Keilsteins, bei Wörth. Juli.

1145. *Parasitella* H. Aus Baumschwämmen erzogen.

1146. *Infimella* Heyd. Einzelne Exemplare unter hiesigen Vorräthen der *Granella*.

1147. *Granella* L. Schädlich; in der Nähe von Kornvorräthen, doch auch häufig an den Stämmen der ital. Pappel. April bis Juni.

1148. *Misella* Zell. Im botanischen Garten im Juni. Wörth. Juli.
 1149. *Spretella* WV. Im Weintinger Holz im Juli, auch in Häusern.
 1150. *Pellionella* L. In Häusern. Juli, August.
 1151. *Simplicella* Zell. Im Juli einzeln an Rainen.
 1152. *Ganomella* Tr. Selten; an den Winzerbergen. Juni, Juli.
 1153. *Ignicomella* FR. Im Weintingerholz in jungen Schlägen Juli.
 1154. *Albicomella* FR. Ebenda; einzeln.
 1155. *Vinculella* FR. Im Juli am Keilstein.
 1156. *Bistrigella* Haw. Einzeln; Keilstein.

323. *Nemophora* WV.

1157. *Swammerdamella* L. Häufig, im Mai an fast allen Hecken.
 1158. *Schwarziella* Zell. Selten, bei Kleinprüfening und Tegernheim im Mai.
 1159. *Pilella* WV. Nicht selten, an Fichten bei Tegernheim, Pentling, Weinting, Gebraching. Mai, Juni.
 1160. *Pilulella* H. In Nadelwäldern ziemlich gemein. Mai, Juni.

325. *Blabophanes* Zell.

1161. *Imella* H. Selten; im Lappersdorfer Wäldchen und mehreren anderen Stellen. Mai, Juni, August.
 1162. *Ferruginella* H. Wörth. Juli.
 1163. *Monachella* H. Abends an den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juni, Juli.

327. *Monop's* WV.

1164. *Rusticella* H. Selten; an den Winzerbergen in Felsenlöchern. Juni.

331. *Tineola* HS.

1165. *Biselliella* Humm. Häufig in Wollenmöbeln. Zerstört auch Insektensammlungen. Das ganze Jahr.

332. *Euplocamus* Ltr

1166. *Fuesslinellus* Sulz. Sehr selten; am Mittelberg, bei Stauf und Wörth. Mai, Juni.

336. *Solenobia* Dup.

1167. *Pineti* Zell. Den Sack im Herbst von Fichtenflechten geklopft und erzogen. Hfm.
 1168. *Triquetrella* FR. Der Sack im April an Felsen bei Schwabelweiss und Kleinprüfening. Schmetterling im April. Hfm.
 1169. *Lichenella* L. Sack im April an Felsenflechten; auch im Herbst an Flechten junger Eichen gefunden. Schmetterling im März und April; nur Weiber. Hfm.

341. *Scythropia* WV.

1170. *Crataegella* L. Nicht selten, besonders das Gespinnst der Raupe. Juli.

342. *Hyponomeuta* Ltr.

1171. *Stanniella* Zell. Nur einmal Mitte Juni bei Etterhausen.
 1172. *Plumbella* WV. Nicht selten in Hecken. Juli, August.
 1173. *Irrorella* H. Selten, im Weintinger Holz. Juli.
 1174. *Variabilis* Zell. Gemein an Schlehenhecken. Juli.
 1175. *Malinella* Zell. Nicht selten.
 1176. *Evonymi* Zell. Gemein; Schwabelweisser Berge. Juli, August.
 1177. *Padi* Zell. Gemein in Hecken mit *Prunus Padus*. Juni, Juli.

343. *Glyphopteryx* HV.

1178. *Bergstraesserella* F. Am Fuss der Stauferberge. Mai, Juni.

344. *Aechmia* Tr.

1179. *Thrasonella* Scop. An vielen Stellen häufig um *Juncus*. Juni.
 1180. *Equitella* Scop. An kahlen Bergen häufig. Juni bis August.
 1181. *Fischeriella* Zell. Häufig wie vorige. Mai, Juni.

46. *Simaethis* Leach.

1182. *Diana*. Nur nördlich von Gebraching. Juli.
 1183. *Pariana* L. Im Juli und August, besonders auf blühendem

Tanacetum. Einmal im Juni von einer Raupe geschlüpft, die auf Rosen lebte. Hfm.

1184. *Fabriciana* L. Ziemlich selten. Die Raupe im Mai im zusammengesponnenen Nesselblättern. O. Hfm.

348. *Diplodoma* Zell.

1185. *Marginepunctella* Stph. Den Sack fanden wir im Herbst und Frühjahr an den Stämmen und unter der Rinde alter Bäume bei Tegernheim und Wörth. Schmetterling im Juni. Hfm.

349. *Nemotois* WV.

1186. *Scabiosellus* Scop. Häufig auf Scabiosen, Juni bis August.
 1187. *Violellus* WV. Selten; im Weintinger Holz, Kleinprüfening. Juli, August.
 1188. *Schiffermüllerellus* WV. Selten; an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.
 1189. *Minimellus* WV. Selten, auf dem Mittelberg. Juli, August.
 1190. *Dumeriliellus* Dup. Gemein, am Mittelberg, bei Gebraching und Wörth. Ende Juni bis Anfang August.

350. *Adela* Ltr.

1191. *Fibulella* WV. Oft häufig; an den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Mai, Juni.
 1192. *Rufifrontella* Tr. Immer selten. Auf Wiesen bei Kleinprüfening.
 1193. *Frischella* H. Auf dem Bruderwörth im Mai an den Blüten von *Symphytum*.
 1194. *Viridella* Scop. Häufig im Mai an jungen Eichentrieben, Mittelberg &c.
 1195. *Tombacinella* FR. Im Juni und Juli auf dem Mittelberg nicht selten.
 1196. *Cuprella* WV. An den Schwabelweisser Bergen und bei Kleinprüfening an blühenden Saalweiden. Mai.
 1197. *Degeerella* L. Häufig an Scabiosen. Juni, Juli.
 1198. *Ochsenheimerella* H. Einzeln, bei Kleinprüfening, Gebraching, Mittelberg, im Mai u. Juni, um Nadelholz.

1199. *Associatella* FR. Um Nadelholz, hinter Grass. Mai.
 1200. *Sulzeriella* H. Nicht selten, bei Hohengebraching. Mai, Juni.
 1201. *Congruella* FR. Hinter Grass, Stauf, Weinting. Juni, ziemlich selten.

351 *Roeslerstammia* Zell.

1202. *Cariosella* Zell. Gemein in Schlägen bei Gebraching. Mai, Juni, August.

352 *Plutella* Schr.

1203. *Porrectella* L. Häufig in Gärten an Hesperis. Mai, Juni
 1204. *Xylostella* L. Die ganze gute Jahreszeit hindurch an allen Rainen und Hecken; besonders häufig an Haidekraut.

353. *Ochsenheimeria* HV.

1205. *Taurella* WV. Einmal im Laberthal von Fichten geklopft. August. Hfm.
 1206. *Urella* FR. Im Grasser Wäldchen von hohem Grase gestreift, oft in Begattung. August.

354. *Atemelia* HS.

1207. *Torquatella* Lien. Ende Juli am östlichen Abhange des Mittelberges von Haide; auch in Begattung. HS.

356. *Talaeporia* HV.

1208. *Pseudobombycella* H. Die Säcke bei Etterzhausen an Felsen, im Weintinger Holz an Stämmen im Herbst gefunden. Hfm.

357. *Dasystema* Curt.

1209. *Salicella* H. Einzeln erzogen. März. Hfm.

358. *Diurnea* Kirb.

1210. *Phryganella* H. In Schlägen bei Weinting, Gebraching und Etterzhausen im Oktober.
 1211. *Fagella* WV. Häufig im Weintinger Holz und andern Stellen. März bis Mai.

359. *Semioscopis* HV.

1212. *Avellanella* H. An Birkenstämmen im Weintinger Holz. März, April.
 1213. *Strigulana* WV. Selten.
 1214. *Alienella* Tr. Selten; an Birkenstämmen im Weintinger Holz; März, April.

360. *Depressaria* Haw.

1215. *Liturella* H. Raupe in Gespinnsten auf *Hypericum*, schlüpft im Juli.
 1216. *Conterminella* FR. Selten; Raupe auf Weiden.
 1217. *Vaccinella* H. Selten, bei Tegernheim, Wörth, Sinzing. April, Mai.
 1218. *Applana* F. Ueberall nicht selten. Juli bis April.
 1219. *Albipunctella* H. Selten.
 1220. *Emeritella* Heyd. Am Mittelberg selten.
 1221. *Capreolella* Zell. Auf den Winzerbergen, bei Gebraching und Weinting im März und April.
 1222. *Assimilella* Ti. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juli.
 1223. *Atomella* WV. Im Weintinger Holz und bei Gebraching. September.
 1224. *Characterella* WV. Die Raupe lebt im Mai in den jungen Knospen der Saalweiden bei Gebraching. Schmetterling im August. Hfm.
 1225. *Depunctella* Pod. Selten, an den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz im Juli und August.
 1226. *Arenella* WV. Nicht selten im Weintinger Holz und an den Schwabelweisser Bergen. Juni bis Oktober.
 1227. *Propinquella* Tr. Selten, im Weintinger Holz im Mai, September.
 1228. *Laterella* WV. Selten, am Mittelberg und im Weintinger Holz. Juli.
 1229. *Angelicella* H. Selten.
 1230. *Flavella* H. Selten.
 1231. *Culcitella* Tr. Selten; Abends an den Schwabelweisser Bergen an *Echium* fliegend. Juni, Juli.

1232. *Badiella* H. Selten, im Weintinger Holz. Juli.
 1233. *Impurella* Tr. Selten.
 1234. *Daucella* WV. Selten.
 1235. *Chaerophylli* Zell. Selten.
 1236. *Libanotidella* Schlaeg. Die Raupe auf dem Mittelberge im Juli u. August häufig.
 1237. *Pimpinella* Zell. Selten.
 1238. *Depressella* F. Einzeln.
 1239. *Dictamnella* FR. Raupe lebt in Gespinnsten an den Blüten des Diptam an den Schwabelweisser Bergen nicht selten, schlüpft im Juli, August.

361. *Epigraphia* Stph.

1240. *Steinkellneriana* WV. Selten.

362. *Carcina* HV.

1241. *Fagana* WV. Selten, am Abhang des Mittelberges von Buchen geklopft. Juli, August.

363. *Psecadia* HV.

1242. *Funerella*. Von Forstrath Koch; nicht mit Sicherheit aus hiesiger Gegend.
 1243. *Decemgutella* H. An den Schwabelweisser Bergen gefangen Juni. Hfm.
 1244. *Sexpunctella* H. Selten; im Weintinger Holz und am Mittelberg. Juni, Juli.
 1245. *Echiella* WV. Ziemlich selten. Keilstein.

364. *Lamprus* Tr.

1246. *Oliviella* T. Selten; auf Dolden bei Tegernheim und Wörth. Juli.
 1247. *Denisella* WV. Bei Kleinprüfening und Mariaort. Mai.
 1248. *Sordidella* H. Selten; Keilstein und bei Stauff. Juni, Juli.
 1249. *Ferruginella* WV. Verbreitet und nicht selten. Keilstein, Zeitlarn. Juli.
 1250. *Tinctella* H. Im Juni und Juli um Nadelholz und an den Winzerbergen.

1251. *Flavifrontella* WV. Selten; am Tegernheimer Keller, bei Wörth. Ende Mai, Anfang Juni.
1252. *Sulphurella* H. Bei Kleinprüfening und am Mittelberg. Mai, Juni.
1253. *Proboscidea* Sulz. Nicht selten, an Hecken bei Weinting, Pentling, Tegernheim &c. Juni, Juli.
1254. *Cinnamomea* Zell. In Nadelholz. Weinting, Grass. Juli.
1255. *Minutella* WV. Im Weintinger Holz. Juni. In Häusern das ganze Jahr hindurch.
1256. *Similella* FR. Einmal an Nadelholz, Juni.
1257. *Luridicomella* FR. Selten; Grass, Stauff; Juli, August.
1258. *Procerella* WV. Im Weintinger Holz, bei Stauff, hinter dem Mittelberg. Juli.
1259. *Schaefferella* H. Selten und einzeln.

Oegoconia Guen.

1260. *Quadrupunctella* Haw. An den Hecken am Fusse des Keilsteins. HS. Juli.

365. *Carposina* Zell.

1261. *Berberidella* Mann. Eben da an Berberis. Juni.

366. *Hypercallia* Sthp.

1262. *Christiennella* Zell. Nicht selten in Schlägen bei Tegernheim und an den Winzerbergen. Juni, Juli.

368. *Henicostoma* Sthp.

1263. *Lobella* WV. Bei Lappersdorf und Wörth. Juni. Selten.

373. *Pleurota* HV.

1264. *Bicostella* L. Häufig in Schlägen mit Haidekraut. Mai, Juni.
1265. *Schlaegeriella* Zell. Häufig an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.

374. *Rhinosia* Tr.

1266. *Asperella* L. Im Weintinger Holz und bei Kleinprüfening im Herbst und Frühjahr.

1267. *Scabrella* L. In den Promenaden, sehr selten. HS.
 1268. *Antennella* WV. Am Fuss des Keilstein an Hecken; bei Wörth. Juli, September.
 1269. *Silvella* L. Einzeln; August.
 1270. *Falcella* WV. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz im Juli
 1271. *Harpella* WV. Selten; im Weintinger Holz und im botanischen Garten. Juli, August.
 1272. *Fissella* H. An Fichten bei Weinting, Gebraching, Etterzhäusen, Tegernheim. Juli bis Oktober.
 1273. *Sequella* Clerck. Selten hinter dem Mittelberge, Juli.
 1274. *Vitella* Clerck. Im Weintinger Holz und bei Gebraching im März u. April. Juli.

375. *Theristis* HV.

1275. *Cultrella* H. Selten.

376. *Anarsia* Zell.

1276. *Spartella* Schr. An den Schwabelweisser Bergen und hinter Grass. Mai, Juni, August.

377. *Hypsolopha* F.

1277. *Juniperella* L. Sehr selten. Gebraching. Juli.
 1278. *Fasciella* H. Gemein in Hecken auf den Winzer- und Schwabelweisser Bergen. Mai, Juni.
 1279. *Quadrinella* FR. Selten an den Hecken am Fuss des Keilsteins. Juli.
 1280. *Barbella* WV. Sehr selten; auf dem Weg nach Grass, bei Lappersdorf und am Osterberge Mai, Juli.
 1281. *Marginella* F. Selten, am Keilstein. Juli.

378. *Sophronia* HV.

1282. *Parenthesella* L. Im Weintinger Holz, bei Wörth, zwischen Grass und Gebraching, gesellschaftlich Juli.
 1283. *Humerella* WV. Nicht selten; am Rand von Weinbergen. Juni.
 1284. *Chilonella* Ti. An den Schwabelweisser und Winzerbergen und im Lappersdorfer Hölzchen Juni, Juli.

1285. *Consanguinella* FR. Einzeln. Hfm.
1286. *Sicariella* Zell. Nicht selten an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.
380. *Gelechia* HV.
1287. *Verbascella* WV. Raupe häufig an *Verbascum* auf den Winzerbergen u. a. O. Juti.
1288. *Sabinella* Bd. Ein Exemplar von E. Hfm. bei Wörth.
1289. *Gibbosella* Zell. Einmal im Juli geschlüpft, wahrscheinlich von Etterzhausen.
1290. *Aleella* F. Selten; in den Thälern hinter Donaustauf im Juni, bei Gebraching und beim Tegernheimer Keller.
1291. *Albicipitella* FR. Sehr selten.
1292. *Gemmella* L. (*Lepidella* FR.) An den Schwabelweisser Bergen, bei Gebraching und Kleinprüfening im August an Föhren.
1293. *Quadrella* F. An den Schwabelweisser Bergen und am Mittelberg um Berberis, nicht selten.
1294. *Electella* FR. An Fichten bei Weinting, Gebraching und am Mittelberg. Juli, August.
1295. *Luculella* H. Sehr selten; Gebraching.
1296. *Apicistrigella* FR. Sehr verbreitet, an bemoosten Felsen. An den Winzer- und Schwabelweisser Bergen, bei Weinting im Juni bis August.
1297. *Nanella* WV. Selten; im Weintinger Holz; Keilstein. Juli.
1298. *Alburnella* Ti. Weintinger Holz im Juli. Hfm.
1299. *Vulgella* WV. Selten; Stauf, im Weintinger Holz. Juni, Juli.
1300. *Euratella* Ti. Im Grasser Wäldchen häufig um Saalweiden. Mai, Juni.
1301. *Proximella* H. Häufig in Birken- u. Erlenschlägen. Mai, Juni.
1302. *Dodecella* L. Grasser Wäldchen, Keilstein. Juni.
1303. *Triparella* Zell. In den Thälern hinter Stauf. Mai, Juni.
1304. *Rhombella* WV. Bei Wörth auf dem Herrnberg. Juni. E. Hfm.
1305. *Mouffetella* L ? (*Pedisequella* H.) An den Schwabelweisser Bergen und im botan. Garten. Raupe an *Lonicera*. Schm. Juni.

1306. *Artemisiella* Ti. Gemein an allen Rainen, an Thym. serp. Juni, Juli.
1307. *Galbanella* FR. Selten; im Weintinger Holz und am Mittelberg. Juni, Juli.
1308. *Terrella* WV. Sehr gemein an Rainen. Juni bis August, am häufigsten auf den Blüten des Tanacetum.
1309. *Distinctella* FR. Schwabelweisser Berge. Juni bis August.
1310. *Senectella* Zell. Grass, Weinting, Lappersdorf. Juli.
1311. *Malvella* FR. Die Raupe im botanischen Garten, hinter Grass und am Fuss des Keilsteines, in dem Samen der Malven. Der Schmetterling im Juli und August um Malven selten.
1312. *Solutella* FR. Auf der Höhe der Schwabelweisser Berge. Mai, Juni.
1313. *Infernella*. An den Schwabelweisser Bergen und bei Lappersdorf im Juli.
1314. *Decrepidella* HS. Mariaort, Keilstein. Juli.
1315. *Murinella* Mann. Im Mai einzeln.
1316. *Incomptella* HS. Gebraching, Tegernheim. Mai, Juni.
1317. *Velocella* Ti. Selten; Keilstein. Juni.
1318. *Lentiginosella* FR. Auf einer Wiese hinter Grass. August. HS.
1319. *Flavicomella* Mtzn. Selten; an den Schwabelweisser und Winzer Bergen. Mai.
1320. *Peliella* Ti. Bei Wörth auf dem Herrnberg. Mai.
1321. *Oppletella* HS. Bei Stauf im August. HS.
1322. *Continuella* Zell. Zwischen Zeitlarn und Regenstauf in Föhrenwäldchen. August. HS.
1323. *Basaltinella* Zell. Am Mittelberg und den Winzerbergen. Juni bis August.
1324. *Scotinella* Mtzn. - Bei Stauf im August; selten.
1325. *Ericetella* H. (*Gallinella* Ti &c.) Häufig in allen Schlägen mit Haide. Mai, Juni.
1326. *Cautella* Zell. Stauferberge, Gräss. Juni, Juli. HS.
1327. *Turpella* Mus Schiff. (*Pinguinella* Tr.) An Pappelstämmen in Alleen, häufig. Die Puppe unter loser Rinde in Unzahl.
1328. *Sororculella* H. Um Wollweiden. Pentling.
1329. *Vicinella* Dgl. Gebraching. Mai bis Juli.

1330. *Marmorea* Haw. An Föhren bei Tegernheim, Pentling, Weinting. April, Mai, Juli.
1331. *Maculatella* H. Nur einmal am Keilstein; August. HS.
1332. *Cytisella* Ti. Selten; an den Schwabelweisser Bergen und bei Kleinprüfening. Mai, Juni.
1333. *Tischeriella* FR. An den Schwabelweisser Bergen und bei Wörth. Juni.
1334. *Leucomelanella* Zell. An den Sinzinger- und Winzerbergen und bei Wörth. Juni, August.
1335. *Luctuella* H. An Nadelholz, hinter Grass. HS.
1336. *Sestertiella* FR. Seit lange nicht mehr gefunden.
1337. *Zebrella* Ti. An Haide auf dem Mittelberg und bei Gebraching. Mai, Juni.
1338. *Mulinella* Ti. Einzeln.
1339. *Pictella* Zell. An den Winzerbergen beim goldenen Kreuze. Juni.
1340. *Superbella* Ti. Im Mai einzeln.

381. *Anacamptis* Curt.

1341. *Alacella* Zell. In Schlägen bei Hohengebraching, Keilstein. Juli, August.
1342. *Populella* L. Häufig an Espenstämmen. Juni, Juli.
1343. *Vetustella* FR. An den Schwabelweisser Bergen, am Mittelberg und bei Gebraching. Mai bis Juli.
1344. *Coronillella* Ti. Ueberall häufig. Mai bis Juli.
1345. *Scintillella* FR. An den Schwabelweisser Bergen im Juli und August. Seltener.
1346. *Ligulella* WV. Selten, im Juli.
1347. *Vorticella* Scop. Ueberall gemein. Mai, August.
1348. *Taeniolella* Tr. Ueberall gemein. Juni, Juli.
1349. *Umbriferella* FR. Im Weintinger und Grasser Holz im Juli.
1350. *Albopalpella* HS. Im August einzeln.
1351. *Anthyllidella* H. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz häufig. Mai bis August.
1352. *Subsequella* FR. Von den Winzerbergen bis Stauf. Juli, August.
1353. *Unicolorella* Zell. Mehr in den südlichen Schlägen. Juni bis August.

1354. *Tenebrella* Zell. Gebraching. Juni, Juli.
 1355. *Tenebrosella* FR. Weinting, Wörth. Juni.
 1356. *Naeriferella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen, bei Lappersdorf und im botanischen Garten Mai, August.
 1357. *Stipella* H. Bei Wörth. Mai.
 1358. *Decurtella* H. Bei Lappersdorf, an den Schwabelweisser und Winzerbergen und bei Weinting. Juli, August.
 1359. *Ericinella* Zell. Häufig auf Haide. Juli, August.
 1360. *Hermannella* F. Im Weintinger Holz und an den Schwabelweisser Bergen. Mai, Juni.
 1361. *Dissonella* FR. Am Mittelberg an Obstbäumen; Juli.
 1362. *Cinerella* L. Gemein, in Laubholzschlägen. Juni bis August.
 1363. *Dimidiella* H. An den Schwabelweisser und Winzerbergen. Am häufigsten auf dem Bruderwörth. Juni, Juli.
 382. *Mesophleps* HV.
 1364. *Silacella* H. An den Schwabelweisser Bergen im Juni. Einzeln.
 383. *Eupleuris* HV.
 1365. *Coenulentella* FR. Nur einzeln.
 1366. *Striatella* WV. Gemein an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Mai bis Juli. Um *Leucanth. corymbos.*
 384. *Chelaria* Haw.
 1367. *Conscriptella* H. Im Weintinger Holz und am Keilstein, im August.
 385. *Recurvaria* Haw.
 1368. *Leucatella* L. Bei Tegernheim an Birnbäumen. Juni, Juli.
 (Fortsetzung folgt.)