

Correspondenz - Blatt
des
zoologisch-mineralogischen Vereines
in
Regensburg.

Nr. 9. 20. Jahrgang. 1866.

Vereins - Angelegenheiten.

Neue Einläufe zur Bibliothek.

63. Würzburger naturwissenschaftl. Zeitschrift.
6. Bd. 2. Heft mit 3 lith. Tf. Würzburg 1866.

64. Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellsch. 18. Bd.
1. Heft. mit 1 Tafel. Berlin 1866.

65. Neueste Schriften der naturforsch. Gesellsch. in Danzig
4. 5. 6. Bd. jeder in 4 Heften. 4^o. Neue Folge 1. Bd. Heft 1 u. 2.
1843—1863.

66. Sitzungsberichte der K. Bayer. Akad. d. Wiss. 1866. I.
Heft 3. München 1866.

67. Memoires de la Soc. Imp. d. Sc. naturelles de Cher-
bourg. T. XI. 1865.

68. Anales del Museo publico de Buenos aires par dar a
concer los objectos de la historia natural nuevos ó poco conoci-
dos etc. por H. Burmeister. Entrea primera. Buenos aires
1864. 4^o. Inhalt: 1) Ueber die Gründung und Entwicklung des
öffentl. Museums. — 2) Die Ziele und Resultate der Palaeontolo-
gie. — 3) Macrauchenia patagonica mit 4 schönen lithogr. Tf.
— 4) Ueber die von Azara beschriebenen Kolibris. — 5) Vor-
läufiger Bericht über die Glyptodonten des Museums.

1866.

9

69. Atti dell'imp. reg. Istituto Veneto Tom. 10. Ser. 3. Disp. 10. Venezia 1864/5.

70. Der Zoologische Garten, herausgeg. von Dr. F. C. Noll. VII. Jahrg. Heft 1—6. Frankfurt a. M. 1866.

71. Württembergische naturwissensch. Jahreshefte. 21. Jahrg. 1—3. Heft 1865—1866.

Schmetterlinge aus Cuba.

(Forts. zu pg. 120).

VIII. *Ecpantheria* HV. 9. *albicornis* Grote t. 4. f. 4. Kleiner als *scribonia* und *cunigunda*, die männlichen Hfl am Afterwinkel bei weitem nicht so vorgezogen.

Eupseudosoma Gr. *niveum* Gr. citirt mit ? meine fig. 279 der exot. Schm. Ich erhielt ihn nicht von Hrn. Gundlach.

IX. *Robinsonia* Gr. 10. *formula* Gr. t. 4. f. 3. Beide Geschlechter von H. Gundlach. 158/162.

Diese Art gehört nach meiner Analyt. Tafel pg. 95 unter die *Arctioidea syntomidiformia* II, bildet aber hier eine eigene Abtheilung neben *Cretonotus* m. Diese Gattung zeichnet sich aus durch lappenförmige Erweiterung des VR der männlichen Hfl, deren Rippe 5 fehlt, 6 + 7 lang gestielt, 8 vor dem Ende des VR der MZ; in dieser mehllartige dicke Beschuppung. Vfl 12. 6 und 7 aus der Spitze der MZ, 7 : 8 + 9, 10. Die männlichen Fühler haben lange Haarpinsel. *Robinsonia* hat andern Hfl weder Lappén noch mehllartige Beschuppung, 3 + 4, 6 + 7 lang gestielt. Vfl 7 : 8 + 9; 10 aus der MZ, 11 fehlt.

Nivea, vertice, pectoris margine antico et abdomine vitellinis, partium thoracis et alarum anticarum margine omni late fasciaque obliqua cinereo-fuscis.

X. *Halisidota* HV. 11. *cinctipes* Gr. Poey 169. Von *teselaris* HZtr. durch braun bandirte Beine, dunklere Grundfarbe, breitere und schärfere Binden unterschieden.

Halis. 12. *cubensis* Gr. Roseocinerea, occipite et abdominis dorso purpureis, thoracis partibus nigris, roseomarginatis, abdominis segmentis lateribus supra et infra nigro maculatis, alis subhyalinis, anter. costis et lineis intercostatibus subinterruptis fuscis; basi intus rosea. 293/611.