

Literatur.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. 13. Band. 1868.

Der als Sammler und Beobachter rühmlichst bekannte Herr H. B. Möschler in Kron-Förstchen bei Bautzen beabsichtigt „die Kleinschmetterlinge der Oberlausitz zu beschreiben“ und beginnt mit der Familie der *Argyresthiden*, von welchen nach ihm bisher 39 europ. Arten bekannt sind, deren 23 bis jetzt in der Oberlausitz gefunden wurden.

Die Gattungsmerkmale sind genau und scharf angegeben. Die Gattungen und Arten in analytischen Tafeln zusammengestellt, für erstere ausschliesslich die Flügelrippen benutzt und durch Zeichnungen erläutert.

Von den 20 aufgezählten *Argyresthien* sind bei Regensburg bis jetzt erst 17 entdeckt, fehlen also nach meinem Syst. Verz. von 1862: *dilectella*, *sorbiella* und *spiniella*; dagegen habe ich seit Herausgabe dieses Verz. *andereggiella* und *semipurpurella* Hm. (Bresl. Ztschr. 1854) für hier aufgefunden, beide im Naabthale. — Beide Arten von *Cedestis* und die einzige von *Ochrostoma* kommen auch bei Regensburg vor. — *Zelleria* fehlt dortwie hier.

In Wocke's Catalog finden sich 33 *Argyresthien* aufgezählt, von welchen er aber 5 nicht kennt: 1981. *purpurascetella* Stt. Zool. 1849 hat dieser selbst in seinem Manual 1859 nicht mehr beachtet und in seinen Ins. brit. 1854 bezweifelt er selbst schon die Verschiedenheit der beiden einzigen ihm bekannten Stücke von der *nitidella*. 1994. *inauratella* Tengstr. von Zeller anerkannt, aber sonst Niemanden bekannt. — 1983. *rufella* Tengstr. Nach meinen Notizen hatte ich sie von Delaharpe aus den Alpen in Händen, aber damals für eine *Swammerdamia* erklärt; diesem Expl. fehlten die schwarzen Stäubchen der Mittellängslinie der Vfl. — 2002. *laevigatella* m. S. B. V. p. 271. Ich fand dieses Thier jedesmal in 1—2 Expl. während meines dreimaligen Aufenthaltes in Samaden, genau mit dem Heyden'schen Exemplar stimmend. — 2011. *decimella* Stt. Cat. fehlt im Stt. Manual ganz, in seinen Ins. Brit. beschreibt er sie ausführlich, die Beschreibung der Zeichnung passt aber nicht in diese Gattung. Eine genauere Besprechung halte ich angezeigt für:

1) *semitestacella* Curt. Dieses Bild gibt keine Sicherheit; der in der Mitte des IR verlöschende weisse Streif kommt eben

so wohl jener Art mit ganz weissen Palpen zu, als jener, deren Palpen unten von der Grundfarbe der Vfl sind. Der in der Mitte braune Scheitel und der ganz braune Thorax sind jedenfalls unrichtig, der Name ist also keiner Berücksichtigung werth, um so mehr, als schon Stephens ihn mit? angeführt. Dieser lässt den weissen IRstreif schon von einer verschwindenden bräunlichen Binde durchschnitten sein. Ueber die Farbe der Palpen sagt er nichts, deshalb ist auch Stt. nicht als Autor zu citiren. — Auch Zeller Linn. II. p. 258. 1847 weiss nichts daraus zu machen. — Stainton Ins. brit. 1854 p. 183 nennt die Palpen „yellowisch“, was eben so gut auf die bisweilen etwas gelblichen Palpen der einen als die unten entschieden rostgelben bis braunrothen der anderen Art gedeutet werden kann. — Staintons Bezeichnung im Manual entscheidet nichts.

2) *fundella* u. *retinella*. Der Unterschied ist nicht genug hervorgehoben, doch ist auch in meiner Syst. Bearbeitung Einiges unrichtig, so namentlich, dass *fundella* grösser sei, sie ist nur etwas plumper und hat kürzere, gerundete Vfl, ihre gitterartige Zeichnung ist licht gelbbraun und besteht aus grösseren Fleckchen, namentlich an der Spitzenhälfte des VR und auf der Mitte des IR. Bei *retin.* ist die Zeichnung viel feiner, schwarzgrau, im Discus etwas hinter der Flügelmitte und vor der Spitze wolkig getrübt. Das Bild bei FR scheint so wie seine Beschreibung aus beiden Arten zusammengesetzt.

3) *curvella* u. *sorbtiella*. Auch hier ist der Unterschied nicht genügend hervorgehoben, erstere Art hat viel stumpfere Vfl., auf $\frac{1}{3}$ ihres IR steht wie bei *sorb.* ein dunkler Fleck, der ist aber kleiner, oft nur ein Punct; das Band aus der Mitte des IR steht in der Regel ganz vertikal, nie so schräg als bei *sorb.* und hängt mit einem viereckigen Fleck hinter der Mitte des VR fein zusammen.

4) *dilectella*. Die angeblich gelbe Farbe der Palpen sticht sehr wenig von der Weisse des Kopfes ab. HS.

Tijdschrift voor Entomologie &c. s' Gravenhage.
Ser. II. Deel 1. 1866.
pg: 57. Zwei neue Pieriden von Snellen v. Voll. — *P. chryso-*
metaena pl. 1. 1, 2. — Insel Kajoa; neben *candida* und

- poecilea*. — *P. polisma* Hew. f. 38. mas. — foem. pl. 1. 3, 4.
— *P. fatime* von Celebes; nächst *placidia* foem.
- pg. 61. *Anerastia farrella* Curt. — H. Sn. erwähnt *leucoloma* HS. Meine Originalbilder stimmen damit zu wenig, um die von Hrn. Sn. vermuthete Identität festzustellen. Hrn. Kaden's dermalen unzugängliche Sammlung wird erst darüber Aufschluss geben können.
- pg. 63. Eine Spielart von *Hepiolus humuli* t. 2. f. 3, 4. (unerheblich).
- pg. 64. Die Raupe von *Luperina literosa*.
- pg. 67. Die Zucht des Japanesischen Eichenspinners *Yama-may*. Berichte aus München, Salzburg, Bamberg, Erlangen und Verona; fast alle mit ungünstigem Erfolge. Ein Nachtrag dazu von Hoffmann in Deel 2 pg. 183.
- pg. 97. P. C. T. Snellen: Die niederländischen Arten der Gattung *Eupithecia* Curt.
Eine sehr beachtenswerthe Abhandlung, wenn auch keine neue Art darin aufgestellt ist. In der Einleitung sind die wesentlichen Körpertheile, insbesondere die Abweichungen in den Flügelrippen, die Beine u. s. w. besprochen, dann eine analytische Tafel der 29 als niederländisch bekannt gewordenen Arten gegeben, unter diesen ist als letzte *E. sparsata* aufgeführt. Die Beschreibungen sind genau und vergleichend, über die Raupen alles Bekannte gesammelt, die 33 Bilder (Ober- und Unterseite) etwa um $\frac{1}{3}$ über der natürlichen Grösse, sind im Umriss gut, in der Ausführung der Zeichnungen zum Theil sehr unbestimmt und ungenau, im Colorit fast durchgängig zu bleich, so dass mehrere die Art kaum erkennen lassen, z. B. *pumilata*, *sobrinata*, *strobilata*, *pusillata*, *nanata*, *tripunctaria*, *castigata*, *pygmaea*.
- pg. 169. Maurissen: Macrolepidopteren des Grossherzogth. Luxemburg; 442 Arten ohne besonders Bemerkenswerthes.
- pg. 189. C. Sn. v. Vollenhoven: Die niederländischen Blattwespen. Zwölftes Stück mit Tab. 7—9 in vortrefflicher Ausführung.
- pg. 209. M. Sn. v. Vollenhoven: *Euploea superba* und *Minetra tigrina* auf tab. 10 sehr schön abgebildet.
- pg. 222 kleinere Mittheilungen; neue exot. Käfer und Wanzen, abgebildet auf tab. 11 und 12.
Deel 2. 1867.
- pg. 20. Wyttevaall: Puppe von *Pyrochroa rubens* und die muthmassliche Raupe einer *Ochsenheimeria*.

- pg. 26. Raupe von *Depressaria ultimella* Stt., eine von *nervosa* verschiedene Art.
- pg. 51. Roelofs: Laufkäfer am Strand des Zuidersee's.
- pg. 52. G. Mayr: Bemerkungen zu den indo-niederländischen Ameisen. Mit Taf. 2.
- pg. 120. Snellen: Kleine Notizen; u. a. über den Unterschied von *Cidaria ferrugaria* und *unidentaria*.
- pg. 124. Stål: Eine neue *Pentatomide* aus Indien.
- pg. 125. v. d. Wulp: 30 neue nordamer. Dipteren mit schönen Tafeln 3—5.
- pg. 165. Snellen v. V.: Niederl. Blattwespen. 13. Stück mit Taf. 6—9.
- pg. 185. Gavere: Notizen zu den niederländ. Macrolep.
- pg. 218. Six u. Snellen v. V.: Ueber einige Hymenopteren und Dipteren mit Taf. 10.
- pg. 236. Backer: Ueber *Psyche villosella* mit Taf. 11.
- Deel 3. 1868.

Liste für die Niederlande neuer Coleopteren.

Für die Niederlande neue Microlepidopt. Darunter *Epischnia farrella* Curt., *Homoeos. binaevella* Z., *Teras rubidana* var. *selasana*, *Tortr. centrana*, *Graphol. tomiana* Z. n. sp., *Platytilus isodactylus* Z. Raupe Anfang August in *Senecio nemor.* m. Taf. 1. 2. illum.

v. d. Wulp: Dipteren aus dem ostind. Archipel mit Taf. 3. 4. illum.

P. C. T. Snellen: Bemerkungen zu HS. Prodrömus. (Sehr beachtenswerth).

S. v. V.: Zur Nomenklatur der Gattung *Euploea*.

— Die niederländischen Hemipteren. Mit sehr schön gezeichneten Steintafeln 5. 6.

Ritsema. Neuer Pulex mit Tafel 7.

S. v. V.: Die niederländ. Blattwespen. 14. St. mit Taf. 8—10.

Anzeige des Buches: De vlinders van Nederland (Macrolepidoptera), systematisch beschreven door P. C. T. Snellen. s'Gravenhage, 1868.

v. d. Wulp: Dipterologische Notizen.

Deel 4. 1869.

S. v. V.: Die niederl. Hemipteren. m. Taf. 1. 2.

v. d. Wulp: Nordamerik. Diptera.

S. v. V.: Verzeichniss d. niederl. Hymenopt. nr. 1—299. *Tenthredinid.*, *Stricid.*, *Cynip.*, *Evaniad.* mit Synonymen, genauer Angabe der Erscheinungszeit, resp. Futterpflanze und illum. Taf. 3.

R. v. Westmaas: Ueber Töden und Aufbewahren von Insecten, bes. der Schmetterlinge.

v. d. Wulp: Dipterol. Notizen. m. ill. Taf. 4.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Krug's Wittwe).