

# Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung  
vorkommen. (Fortsetzung.)

## D. Sphaeridiini.

### 113. *Cyclonotum* Erichson.

kyklos Kreis, notos Rücken.

#### 1) *orbiculare* Fabr.

586.

immaculatum Rossi. — pilula Müller. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei Föhring auf dem Wasser nach einem warmen Regen, mehr kriechend als schwimmend, Juni, Dr. Kr.; Freising g. in Kuhdung; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

### 114. *Sphaeridium* Fabricius.

sphaeridion, kreisförmig.

#### 1) *scarabaeoides* L.

587.

crenatum Beauv. — quadrimaculatum Schrank. — Larve Schiöde Nat. Tidsskr. 1863. p. 221. t. 6. f. 1—10. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Isarufer, Mai, Zillerthal, September, Dr. Kr.; Freising g. im Kuhfladen; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Würzburg; Aschaffenburg s. h. — var. *lanatum* Fabr. — München.

#### 2) *bipustulatum* Fabr.

588.

haemorrhoum Schrank. — marginatum Scriba. — semistriatum Casteln. — testudinarium Fourer. — Larve Schiöde Nat. Tidsskr. 1863. p. 221. t. 6. f. 11—15. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München; Freising g. in Kuhfladen; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg g.; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. Langhans; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg h. — var. *bipustulatum* Steph. — Augsburg; München, bei Maria Einsiedl, Mai, Dr. Kr.; Passau. — var. *marginatum* Fabr. — München bei Maria Einsiedl, Mai, Dr. Kr.; Augsburg; Passau; Regensburg n. s.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s. — var. *quadrimaculatum* Marsh. — Augsburg; München,

115. *Cercyon* Leach.

kerkion ein mythologischer Name.

- 1) **obsoletus** Gyllenh. 589.  
atomarius Payk. — lugubris Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Regensburg s. g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg April, *Bergmann*; Frankfurt, v. H.; Ober-Lais unter faulenden Vegetabilien, Decan *Scr*.
- 2) **haemorrhoidalis** Fabr. 590.  
impressus Sturm. — similis Marsh. — obsoletus Casteln. — melanocephalus var.  $\beta$  Illig. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Erlangen; Nürnberg n. s.; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. s., wie die folgenden besonders in Kuhfladen, im Winter unter Moos. — var. rufipenne Meg. — München.
- 3) **haemorrhous** Gyllenh. 591.  
haemorrhoidalis Fabr. — xanthorrhoeus Steph. — melanocephalus var.  $\beta$  Illig. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Passau; Regensburg s.; Nürnberg g., in Pegnitzgenist. August, Manghofer Weiher; Erlangen; Steigerwald g.; Aschaffenburg n. s.
- 4) **lateralis** Marsh. 592.  
Moosburg; Notar v. *Sonn.*
- 5) **flavipes** Fabr. 593.  
haemorrhoidalis Sturm. — punctulatus Dej. — ustulatus Preyssel. — femoralis Steph. — infuscatus Steph. — melanocephalus var.  $\beta$  Gyllenh. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Tegernsee, April, Königsalpe Juli, Dr. *Kr.*; Freising h., in Isargenist, März, April; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald h.; Aschaffenburg h.
- 6) **littoralis** Gyllenh. 594.  
binotatus Steph. — dilatatus Steph. — ruficornis Steph. — Larve Schiödt Nat. Tidsskr. 1863. p. 220. t. 7. f. 1. — Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
- 7) **unipunctatus** L. 595.  
cordiger Herbst. — ♀ dispar Payk. — ♀ quisquilius Steph. — Zusmarshausen; Augsburg n. s. in Kuhfladen und an toden Thieren, Spickel; München; Tegernsee, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.
- 8) **quisquilius** L. 596.  
minimus Scopoli. — xanthopterus Leichart. — ♂ dispar Payk. — unipunctatus var. Fabr. — München; Freising in Isargenist, März, April und November; Passau; Nürnberg n. s.
- 9) **melanocephalus** L. 597.  
Augsburg; München, Georgenschwaige Mai, Neufenen, September, Dr. *Kr.*; Freising; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald g.; Aschaffenburg n. s.

- 10) **pygmaeus Illig.** 598.  
 ferrugineus Herbst. — erythropus Steph. — fuscescens Steph. — minutus Steph. — stercorator Steph. — Augsburg; München, bei Nymphenburg gestreift, Juli, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg s. var. merdarius Sturm. — Augsburg in Kuhfladen am Wertachufer bei Pfersee, Mai; München.
- 11) **terminatus Marsh.** 599.  
 plagiatus Erichs. — scutellaris Steph. — Augsburg, *Gscheidlen*; München; Nürnberg.
- 12) **nigriceps Marsh.** 600.  
 concinnus Marsh. — atricapillus Marsh. — laevis Marsh.-Melsh. — centrimaculatus Sturm. — mundus Melsh. — troglodytes Dej. — bimaculatus Steph. — ustulatus Steph. — atriceps Steph. — inustus Steph. — nubilipennis Steph. — pygmaeus var. b. Gyllenh. — Augsburg; München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Aschaffenburg n. s.
- 13) **minutus Fabr.** 601.  
 tristis Illig. — bolitophagus Marsh. — convexius Steph. — convexior Steph. — laevigatus Steph. — Augsburg; München; Freising in Isargenist, März, April und November; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s., in Pegnitzgenist, September; Erlangen; Aschaffenburg n. s.
- 14) **lugubris Payk.** 602.  
 convexiusculus Steph. — Augsburg; München; Freising in Isargenist, April, September und November; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s. Zelters-Weiher, Manghofer-Weiher, in Pegnitzgenist, September; Würzburg, April, *Bergmann*; Aschaffenburg s.
- 15) **analis Payk.** 603.  
 flavipes Thunbg. — acutus Steph. — apicalis Steph. — aquaticus Steph. — calthae Steph. — Larve Schiödde Nat. Tidsskr. 1863. p. 220. t. 6. f. 16—25. — Zusmarshausen; Augsburg; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Dr. Kr.; Freising g., Weihestephan von Bäumen geklopft, Juni; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg, Manghofer Weiher, September; Würzburg, April, *Bergmann*; Aschaffenburg s., vorzüglich in Schlamm.
- 16) **granarius Erichs.** 604.  
 Freising, in Isargenist, April; in Hessen n. s., Decan *Scr.*
- 17) **pulchellus Heer.** 605.  
 Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*.

### 116. *Megasternum Mulsant.*

megas gross, sternon Brust.

- 1) **obscurum Marsh.** 606.  
 ferrugineum Marsh. — stercorarium Marsh. — bolitophagum Stephens. — concinnum Steph. — contaminatum Steph. — im-

maculatum Steph. — immundum Steph. — immune Steph. — testaceum Steph. — München; Freising n. s., Marzlinger Wiese, und in Isargenist, September, Oktober; Passau; Erlangen; Aschaffenburg s.

### 117. *Cryptopleurum Mulsant.*

kryptos verborgen, pleuron die Seite.

#### 1) *atomarium Fabr.*

607.

crenatum Panz. — merdarium Steph. — minutum Payk. — Ueberall und in jeder Jahreszeit h. Im Sommer vorzüglich in Kuhdung und unter faulenden Vegetabilien, im Winter unter Moos.

In Baiern finden sich 82 Arten und 12 Varietäten; 573 Arten sind bis jetzt beschrieben.

## Familie VI. STAPHYLINIDAE.

Die Larven der Raubkäfer gleichen den vollkommenen Insekten etwas mehr als andere, weil diese selbst etwas larvenähnliches haben, wegen ihrer kurzen Flügeldecken und des gestreckten Körperbaues. Ihre Fühler sind vier bis sechsgliedrig, sie besitzen jederseits ein bis sechs Punktangen, sechs kurze, fünfgliedrige, in eine Fussklaue auslaufende Füsse, zwei gegliederte Griffel am Hinterleibsende, dessen After als Nachschieber heraustreten kann. Sie leben von thierischer Nahrung, z. B. anderen Larven, und lassen sich mit Fleisch, aber auch mit faulenden Pflanzenstoffen aufziehen. Da sowohl die Larven als auch die Insekten von Raub leben, sind sie zu den nützlichen Thieren zu zählen. Die Käfer finden sich auf dem Erdboden unter Steinen (*Lithocharis*, *Scopaeus*), unter faulenden Stoffen (*Homalota*), in Dung (*Phionthus*, *Platystethus*), an Aas (*Staphylinus*, *Proteinus*), an Schwämmen (*Boletobius*, *Bolitochara*, *Oxyporus*), unter Baumrinden (*Ploeocharis*, *Ploeopara*), an sandigen Stellen (*Falagria*), an Flussufern (*Autalia*, *Paederus*), in Ameisencolonien (*Dinarda*, *Atemeles*, *Lomechusa*), in Hornissennestern (*Quedius dilatatus*), auf Blüten, deren Saft sie lecken (*Anthobium*, *Anthophagus*). Merkwürdig ist dass die Thiere der Gattung *Spirachtha* und *Corotoca*, welche in Südamerica (Brasilien) sich finden, lebendige Jungen gebären. (*Schödlte*).

## A. Aleocharini.

118. *Autalia* Stephens.

Autalia ein Eigenname.

- 1) *impressa* Oliv. 608.  
 plicata Steph. — ruficornis Steph. — Zusmarshausen; Augsburg; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Dr. Kr.; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s., in Pilzen; Aschaffenburg s. s., in Pilzen.
- 2) *rivularis* Gravenh. 609.  
 aterrima Steph. — angusticollis Steph. — Augsburg, Professor Petry; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Tegernsee April, Dr. Kr.; Freising, Attachinger Au am Bachufer im Herbst; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s., in Pilzen.

119. *Falagria* Stephens.

- 1) *thoracica* Curtis. 610.  
 lineolata Mannerh. — ruficollis Waltl. — Augsburg, ich besitze ein Exemplar von da; München; Aschaffenburg s., Professor Oechsner.
- 2) *sulcata* Payk. 611.  
 caesa Erichs. — Zusmarshausen; Augsburg, im Spickel, Schweiger; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai im englischen Garten April, Kufstein und Rosenheim, September, Dr. Kr.; Freising n. s., Attachinger Au Juli, in Isargenist, März, April und September; Passau; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg n. s. Lichtenhof, September; Erlangen; Steigerwald n. s., unter Steinen; Aschaffenburg n. s.
- 3) *sulcatula* Gravenh. 612.  
 sulcata Payk. — sulcata var. b. Gyllh. — polita Curtis. — confinis Steph. — Larve Heeger Sitz. Wien. XXIV. 1857. p. 315. t. 1. — Augsburg; München; Freising in Isargenist, April, September und November; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg, in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Steigerwald n. s., unter Steinen; Aschaffenburg s.
- 4) *obscura* Grav. 613.  
 flavipes Steph. — floralis Steph. — nitens Steph. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., unter Moos im Frühjahr, auch unter Ameisen; München; Freising, in Isargenist, April, Weihenstephan in Moder, Juli, Wald bei Wippenhausen, August; Passau; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg n. s., Wäldchen bei der Herrnhütte, August; Erlangen; Obersteinach, Ebrach n. s. unter Steinen; Aschaffenburg h.
- 5) *nigra* Grav. 614.  
 fracticornis Grav. — picea Grav. — Augsburg, auf dem Lechfeld bei Mering unter Rasenstücken h., auch unter Ameisen;

München, an der Gartenmauer vor Nymphenburg durch Aufgraben des Bodens, Mai, Dr. *Kr.*; Freising s. h., Sandgrube im Walde bei Wippenhausen, August, Marzlinger Wiese auf Gerölle, April. Attachinger Au, August, am Isarufer in Weidenmoder, September in Isargenist, März; Passau; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg in Pegnitzgenist, August, Schmausenbuck, Herrnhütte, Manghofer Weiher; Erlangen; Obersteinach, Ebrach, s. unter Steinen; Bamberg Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s.

120. *Bolitochara Mannerheim.*

bolites Pilz, chara, Freude.

- 1) *lucida* Grav. 615.  
 elongata Heer. — lunulata var. Gyllenh. — München; Aschaffenburg s.; Offenbach und Frankfurt, v. H.
- 2) *lunulata* Payk. 616.  
 punctata Dej. — cincta Grav. — pulchra Grav. — Augsburg n. s., auch in Ameisennestern; München; Freising s. h. an Schwämmen (Agaricus) im Walde bei Wippenhausen, auch an Amanita muscaria; Passau; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald g. an Schwämmen; Würzburg; Aschaffenburg n. s.
- 3) *bella* Märkel. 617.  
 Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt s. s., Decan *Scr.*
- 4) *obliqua* Erichs. 618.  
 cincta Lacord. — variegata Walzl in litt. — München; Passau.

121. *Silusa Erichson.*

Silus, Teich.

- 1) *rubiginosa* Erichs. 619.  
 Aschaffenburg s. s., im Stockstadter Wald; in Hessen s., Decan *Scr.*

122. *Stenusa Kraatz.*

stenos eng, schmal.

- 1) *rubra* Erichs. 620.  
 rufa Heer. — Dinkelsbühl, h. an Agaricus, Pfarrer *Wolff*; Erlangen.

123. *Ocalea Erichson.*

okaleos schnell.

- 1) *castanea* Erichs. 621.  
 picta Steph. — rivularis Müller. — Regensburg; Ober-Lais an einem Waldbache, Decan *Scr.*

2) **decumana** Erichs. 622.  
Deidesheim Dr. *Eppelsheim*.

3) **badia** Erichs. 623.  
prolixa Gyllenh. — intermedia Chevr. in litt. — Augsburg, Spickel in Moos, *Schweiger*; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s.

### 124. **Stichoglossa** Fairmaire.

stix Reihe, glossa Zunge.

#### **Stenoglossa** Kraatz.

1) **semirufa** Erichs. 624.  
Deidesheim, Dr. *Eppelsheim*.

### 125. **Ischnoglossa** Kraatz.

ischnos, fein, dünn, glossa Zunge.

1) **rufopicea** Kraatz. 625.  
corticalis Steph. — Hessen Decan *Scr*.

2) **corticina** Erichs. 626.  
varia Heer. — convexicollis Thoms. — Aschaffenburg s.; Ober-Lais unter Baumrinden, Decan *Scr*.

### 126. **Leptusa** Kraatz.

leptos dünn.

1) **analis** Gyllenh. 627.  
apicalis Dej. — Larve Perris Ann. Fr. 1853 p. 563. t. 17. f. 17—19. — München.

2) **fumida** Erichs. 628.  
haemorrhoidalis Heer. — morosa Heer. — similis Kellner. — Larve Fauvel. Ann. Fr. 1862. p. 87. t. 2. f. 13. — Ober-Lais unter Baumrinden n. s., Decan *Scr*.

3) **ruficollis** Erichs. 629.  
rubricollis Heer. — Augsburg bei Leitershofen, November *Schweiger*; Ober-Lais n. s., besonders in Moos, das im Winter von Eichbäumen abgekratzt wurde, Decan *Scr*.

(Fortsetzung folgt.)

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).