

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

- 25) **nigrum** Grav. 1383.
salicinum Gyllenh. — Augsburg unter Ameisen; Moosburg,
Notar v. Sonn; Hessen s., Decan Scr.
- 26) **amabile** Heer. 1384.
Hampei Redtenb. — Ober-Lais an Aas in Mehrzahl, Decan
Scr.
- 27) **striatum** Grav. 1385.
minutum Oliv. — sulcolum Steph. — München; Freising s.;
Nürnberg; Aschaffenburg s. s.; Ortenberg n. s.; Decan Scr.
- 28) **pygmaeum** Payk. 1386.
lucidulum Aubé in litt. — Seligenstadt und Ober-Lais s., in
Baumschwämmen, Decan Scr.; Frankfurt, v. Heyden.

A. Acerulia Thomson.

- 29) **inflatum** Gyllenh. 1387.
humerale Dej. — Auf dem hohen Vogelsberge n. s. an saulem
Holze, Decan Scr.
Die Arten leben theils auf Blumen, theils unter Rinde und
faulenden Vegetabilien.

222. Eusphalerum Kraatz.

- 1) **triviale** Er. 1388.
Primulae Steph. — nigricolle Steph. — florale Lac. — Jugend-
heim in der Bergstrasse Mai 1871 von W. Fuchs gesammelt.

223. Anthobium Stephens.

- 1) **signature** Märkel. 1389.
Augsburg s.; Hessen n. s., besonders in Gebirgsgegenden;
Decan Scr.
- 2) **abdominale** Grav. 1390.
semicoleopratum Panz. — Zusmarshausen; Augsburg;
München; Passau; Eichstädt; Nürnberg; Steigerwald h.; Aschaffenburg n. h.
- 3) **limbatum** Erichs. 1391.
♂ fuscipenne Heer. — ♀ adustum Heer. — München; Hessen
n. h., Decan Scr.

- 4) **nigrum** Erichs. 1392.
atrum Heer. — Epstein und Rüdesheim, *v. Heyden*; Ober-Lais in Mehrzahl, Decan *Scr.*
- 5) **florale** Panz. 1393.
Augsburg; München; Nürnberg; Steigerwald g.; Wimpfen und Jugenheim, Decan *Scr.* — var. triviale Erichs. — München; Freising, Wald bei Thalhausen, April in Moos; Steigerwald n. s. (Ist Eusphalerum triviale Er. *v. Heyden*.)
- 6) **minutum** Fabr. 1394.
paludosum Heer. — Ranunculi Grav. — picipenne Steph. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München, zwischen dem Krankenhaus und Thalkirchen geschöpft, Juni, bei Ebenhausen, Juni, Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising; Passau h., Kr.; Nürnberg s. h.; Erlangen, Steigerwald h.; Aschaffenburg s.
- 7) **luteipenne** Erichs. 1395.
alpinum Heer. — Aschaffenburg n. h.; Frankfurt, *v. Heyden*; Vogelsberg, Decan *Scr.*
- 8) **longipenne** Erichs. 1396.
Imhoffi Heer. — Augsburg; Nürnberg; Hessen, besonders in Gebirgsgegenden, Decan *Scr.*
- 9) **stramineum** Kraatz. 1397.
Taunus, *v. Heyden*; Vogelsberg bei Herchenhain in Mehrzahl, Decan *Scr.*
- 10) **scutellare** Erichs. 1398.
adustum Kiesw. — testaceum Lac. — ♂ Sorbi var. c. Erichs. — ♀ mucronatum Stephens. — Augsburg; Hessen n. s. s., mehr in der Ebene, Decan *Scr.* (torquatum Marsh., Dr. Gemminger.)
- 11) **ophthalmicum** Payk. 1399.
luteum Marsh. — pallidum Grav. — Ulmariae Steph. — Augsburg; München, bei Harlaching durch Schütteln der Gesträuche, Juni, im Lerchenwald von Tegernsee abgeklopft, Juli, Dr. Kr.; Moosburg, Notar *v. Sonn*; Steigerwald n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.* Passau im Neuburger Wald, Juni, *Kittel*.
- 12) **torquatum** Marsh. 1400.
montivagum Heer. — Marshamii Fauvel. — Freising, Weihenstephan, h. von Bäumen geklopft, April; Crónthal und Falkenstein im Taunus, *v. Heyden*; Wimpfen, Decan *Scr.*
- 13) **Sorbi** Gyllenh. 1401.
ophthalmicum Grav. — Augsburg s. h.; München; bei Fürstenau von Crataegus Oxyacantha abgeklopft, Mai, Dr. Kr.; Freising s. h., Weihenstephan, Wald bei Wippenhausen, Wiesenwald, Juni Juli; Nürnberg s. h.; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg. — var. testaceum Gravenh. — Zusmarshausen; München.

14) *silesiacum* Letzn.

rectangulum Fauvel. — Auf dem hohen Vogelsberg, auf nassen Wiesen an Schirmblumen in grosser Anzahl, Decan *Scr.*

15) *rectangulum* Faur.

Passau, bei Hals, Juni, *Kittel*.
Die Arten leben vorzugsweise auf Blüthen, an feuchten Localitäten.

K. Proteinini.

224. *Proteinus* Latreille.

proteinο ich dehne aus.

1) *brevicollis* Erichs.

ovalis Steph. — subsulcatus Steph. — Larve Chap. et Cand. Mém. Liège 1853. p. 201. — Oberbayern, Professor Dr. Waltl; Freising ein Stück in Isargenist, April.

2) *brachypterus* Fabr.

laevicollis Heer. — consimilis Kirby in litt. — ovalis Sturm. — ovatus Grav. — nitidus Steph. — nigricornis Steph. — Zusmarshausen; Augsburg h., Deuringen; Oettingen; München; im Lerchenwald bei Tegernsee in Pilzen, September, an Fliegen schwämmen im Ausgang aus dem Walde auf die Neureuth, August, Dr. Kr.; Freising h., Wiesenwald April, Attachinger Au an Aas, September, Wald bei Thalhausen, November; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s., besonders an Aas.

3) *macropterus* Gyllenh.

Zusmarshausen; Augsburg n. h., Spickel; Oettingen; München; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen und Thalhausen, April und Oktober, in Isargenist, März, April und September, Weihenstephan ein Stück in Eichenmoder, Juli; Regensburg; Hessen n. h., an Aas, Decan *Scr.*

4) *atomarius* Erichs.

clavicornis Stephens. — Augsburg h., Deuringen, Mai; Freising n. s., Weihenstephan in Moder, Juli, Wiesenwald, Plantagenwald in Moos, November, Attachinger Au an Aas, September, in Isargenist, April; Hexenagger bei Regensburg, Dr. von Weidenbach.

Die Arten kommen hauptsächlich in Pilzen vor; Larven wurden im Dezember in faulenden Pilzen beobachtet.

223. *Megarthrus* Stephens.

megarthros mit grossen Gliedern.

1) *depressus* Payk.

macropterus Grav. — emarginatus Steph. — pusillus Steph. — Zusmarshausen; München; Babenhausen einzeln, Decan *Scr.*

- 2) *nitidulus* Kraatz. 1409.
Ober-Lais und Wimpfen, Decan *Scr.*
- 3) *sinuaticollis* Lacord. 1410.
Augsburg; Passau, Professor Dr. Wall; Ortenberg n. s., hauptsächlich im Miste, Decan *Scr.*
- 4) *affinis* Miller. 1411.
sinuaticollis Kraatz. — Bellevoyei Sauley. — Ober-Lais und Wimpfen einzeln, Decan *Scr.*
- 5) *denticollis* Beck. 1412.
affinis Steph. — rufescens Steph. — marginatus Steph. — marginicollis Lac. — hemipterus var. a. Illig. — Zusmarshausen; Augsburg am 18. April 1867 ein Stück am Fenster der Ablasswirtschaft; München; Regensburg; Hessen n. s., hauptsächlich im Miste, Decan *Scr.*
- 6) *hemipterus* Illig. 1413.
melanocephalus Oliv. — nitiduloides Lac. — depressus var. c. Gyllenh. — hemipterus var b. Illig. — München; Regensburg; Hessen vorzugsweise in faulen Pilzen, Decan *Scr.*
Die Käfer kommen unter Moos und im Gemüll vor.

224. *Phloeobium* Erichs.

phloios Rinde, bioo ich lebe.

- 1) *clypeatum* Müller. 1414.
corticale Lac. — flavum Steph. — retusum Steph. — Aschaffenburg s. unter Baumrinden; Hessen s., Decan *Scr.*

L. *Phloeoecharini.*

225. *Phloeocharis* Mannerh.

phloios Rinde, charis Freunde.

- 1) *subtilissima* Mannerh. 1415.
Augsburg; Freising s., Wald bei Wippenhansen, Juni, Marzlinger Wiesen unter Eichenrinde, April, Wiesenwald unter Eichenrinde, September; Regensburg; Nürnberg, Schmausenbuck an Platanen und Eichen, September; Erlangen; Aschaffenburg s., unter Kiefer-Rinden.

M. *Piestini.*

226. *Prognatha* Latreille.

gnathos Kinn.

Siagonium Kirby.

siagon Mandibel.

- 1) *quadricornis* Kirby. 1416.
rufipennis Blondel. — Larve Westw. Zool. Journ. III. 1828. p. 58. t. 2. f. 1. A. — Frankfurt, v. Heyden; Friedberg in der Wetterau, unter Rinde, Hauptmann Fuhr.

N. Micopeplini.

227. *Micopeplus* Latreille.

mikros klein, peplos Decke, Vorhang.

- 1) ***porcatus*** Fabr. 1417.
suleatus Herbst. — Mothani Fauvel. — Augsburg h.; Oettingen; München; Freising h., Weihenstephan, Wiesenwald, in Gras gekötschert, Juni bis Oktober; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg; zwischen Regensburg und Donaustauf, August, Dr. Kr.; Nürnberg h.; Erlangen; Bamberg, Prof. Hoffmann; Steigerwald s.; Würzburg; Aschaffenburg n. s. in Kehricht und Anspüllicht; Ober-Lais besonders an schlammigen Ufern von Bächen, Decan Scr.
- 2) ***caelatus*** Erichs. 1418.
Erlangen.
- 3) ***staphylinoides*** Erichs. 1419.
Hanau, Dr. Zebe.
- 4) ***tessarula*** Curtis. 1420.
baicalicus Motsch. — staphylinoides Gyllenh. — München.
In Baiern finden sich 813 Arten und 41 Varietäten, 4130 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie VII. PSELAPHIDAE.

228. *Chennium* Latreille.

chennion Name eines Vogels.

- 1) ***bituberculatum*** Latr. 1421.
Aschaffenburg s. s., unter Myrmica caespitum bei Schweinheim; Steinheim, Decan Scr; Offenbach und Frankfurt, v. Heyden; Darmstadt, stud. Weis; Mainz, Superintendent Schmidt; Friedberg, Dr. Renner.

229. *Centrotoma* Heyden.

kentron Dorn, tomē Theil, Einschnitt.

- 1) ***lucifuga*** Heyden. 1422.
Bieber bei Offenbach in Nestern von Myrmica caespitum drei Exemplare, bis jetzt die einzigen aus dem Gebiet (Böhmen, Südfrankreich.)

230. *Ctenistes* Reichenbach.

Ctenistes gekämmt.

1) *pulpalis* Rchb.

♂ Dejeani Lep. et. Serv. — München; Fränkische Schweiz, s.; Aschaffenburg s. s., am Fusse des Büchelberges.

231. *Tyrus* Aubé.1) *mucronatus* Panz.

1424.

impressus Sturm in litt. — insignis Reichenb. — sanguineus Payk. — Augsburg unter Ameisen; München; Regensburg s. s., Nürnberg s.; Frankfurt, bei Schwanheim unter Eichenrinde bei Formica fusca, v. Heyden.

232. *Pselaphus* Herbst.

Pselaphao ich berühre, betaste.

1) *Heisei* Herbst.

1425.

brevipalpis Schrank. — eurygaster Beck. — Herbstii Reichb. — gracilicollis Dahl in litt. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Leitershofen unter Ameisen, im Frühjahre in Moos; München; Ammerland am 10. Juni 1867, Freising h.; Wald bei Thalhausen April, in Isargenist, März, April; Passau; Regensburg s.; Fürth, Dr. Langhans; Erlangen; Steigerwald n. s. unter Steinen; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg n. s.

2) *dresdensis* Herbst.

1426.

Heysei Payk. — longicollis Reichenb. — München; Freising; Nürnberg s.; Erlangen; Aschaffenburg s. s.

233. *Tychus* Leach.1) *niger* Payk.

1427.

♂ nodicornis Beck. — ♀ congener Nees v. Esenb. in litt. — ♂ detritus Nees v. Esenb. in litt. — ♂ ruficornis Dahl in litt. — Zusmarshausen; Augsburg n. s. überwintert in Moos; München; Freising n. s., Marzlinger Wiesen, April, Wiesenwald, Pförter Au, in Isargenist, März, April; Moosburg, Notar v. Sonn.; Nürnberg; Fürth, Dr. Langhans; Erlangen; Aschaffenburg n. s., Fasanerie.

2) *ibericus* Motsch.

1428.

dichrous Schmidt. — Frankfurt ein Stück. (Das Frankfurter Stück ist nicht eigene Art, sondern Varietät von *Tychus niger* L. mit rothen Flügeldecken. Diese gute Art kommt nur in Südeuropa an der Seeküste vor, v. Heyden.)

234. *Trichonyx Chaudoir.*

thrix Haar, onyx Klaue.

- 1) *sulcicollis* Reichenb. 1429.
dresdensis Illig. — sulcifrons Dej. — badius Megerle in litt. — Frankfurt, stud. Schmidt; Ober-Lais, Decan Scr.
2) *Märkeli* Aubé. 1430.
sulcicollis Curt. — tuberculatus Müll. in litt. — Seligenstadt, Decan Scr.; Taunus, v. Heyden.

235. *Batrissus Aubé.*

- 1) *formicarius* Aubé. 1431.
Fränkische Schweiz, in hohlen Eichen bei Ameisen; Aschaffenburg s. s., unter gelben Ameisen im Schmerlenbacher Walde; Frankfurt, v. Heyden.
2) *Delaportei* Aubé. 1432.
Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais, Decan Scr.; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
3) *venustus* Reichenb. 1433.
Brullei Aubé. — ♂ Buqueti Aubé. — nigriventris Denny. — gracilis Hoffmng. in litt. — Augsburg; München; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan Scr.; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Frankfurt, Soden und Offenbach, v. Heyden.

236. *Bryaxis Bach.*

- bryaxo ich habe Ueberfluss, ich strotze.
1) *sanguinea* Linné. 1434.
♂ longicornis Leach. — ♂ laminata Motsch. — impressifrons Dej. — testacea Dej. — nigropygialis Fairm. — limnophila Peyron. — München; Freising n. s., Attachinger Au; Passau; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg n. s.
2) *fossulata* Reichenb. 1435.
cruenta Knoch in litt. — fuscipes Dahl in litt. — pratensis Schüppel in litt. — tripunctata Ziegli in litt. — Augsburg g., Leitershofen in Moos, November bis April; München; Freising g. Wald bei Thalhausen, April, Plantagenwald, April, Weihenstephan auf niederen Pflanzen, und in Moder Juli, in Isargenist, März, April; Passau; Regensburg s. g. bei Kumpfmühl; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald n. s. unter Steinen; Aschaffenburg h.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).