

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

258. *Anisotoma* Illiger.

anisos ungleich, tome Theil.

- 1) ***cinnamomea* Panz.** 1564.
picea Steph. — tubercis Steph. — ♂ lycoperdi Steph. — ♀
affinis Schmidt. — grossa Dahl in litt. — München; Passau; Eich-
städt; Fränkische Schweiz; Dinkelsbühl Pfarrer *Wolff*; Hessen s.
Decan *Scr.*, lebt in Trüffeln; Jugenheim in der Bergstrasse ein ♂,
v. Heyden.
- 2) ***rugosa* Steph.** 1565.
arenaria Steph — armata Sturm. — München; Ober-Lais ein
Männchen gekötschert, Decan *Scr.*; Darmstadt Dr. *Nebel*; Frank-
furter Wald, *v. Heyden*.
- 3) ***Triepki* Schmidt.** 1566.
Frankfurter Wald einzeln, *v. Heyden*.
- 4) ***picea* Illig.** 1567.
consobrina Sahlbg. — München.
- 5) ***obesa* Schmidt.** 1568.
♂ picea var. b. Gyllh. — ♀ armata Payk. — ♀ ferruginea Gyllh.
— München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Steigerwald s. an
Schwämmen und alten Baumstücken; Aschaffenburg s.; Frankfurt
v. Heyden.
- 6) ***dubia* Kugellan.** 1569.
Augsburg; München; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*;
Erlangen; Aschaffenburg n. h.
- 7) ***flavescens* Schmidt.** 1570.
Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln Decan *Scr.*; Darmstadt
n. s.; Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
- 8) ***pallens* Sturm.** 1571.
München.
- 9) ***ovalis* Schmidt.** 1572.
Augsburg n. s., Spickel, Juli, Wertacher bei Pfersee, März,
Wulfertshausen, Mai; München; Freising n. s., Weihestephan
von Bäumen geklopft, Mai, Attachinger Au, September; Dinkels-
bühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Steigerwald s.; Odenwald, *Wider*;
Aschaffenburg; Seligenstadt, Darmstadt, Decan *Scr.*
- 10) ***nigrita* Schmidt.** 1573.
Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Frankfurt *v. Heyden*; Ober-Lais
ein Männchen, Decan *Scr.*

- 11) **rubiginosa** Schmidt. 1574.
München; Frankfurt, v. Heyden.
- 12) **scita** Erichs. 1575.
Augsburg; Frankfurt, v. Heyden.
- 13) **calcarata** Erichs. 1576.
ferruginea Schmidt. — Augsburg n. s., Spickel, November;
München; Ammerland; Freising n. s., Attachinger Au und Wiesen-
wald, Juli; Aschaffenburg n. s.
- 14) **badia** Sturm. 1577.
laeviscolis Salberg. — moesta Hampe. — Augsburg, am 3ten
Februar 1867 im Spickel in Moos; München; Freising in Isargenist,
März, April; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Ober-Lais
einzeln, Decan Scr.; in Rheingenist, Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 15) **parvula** Sahlbg. 1578.
badia Schmidt. — brunea Gyllenb. — Gyllenbali Steph. —
Augsburg, ein Stück, in Moos vom Spickel gefunden; München;
Bamberg, Professor Hoffmann; Ober-Lais ein Stück, Decan Scr.

259. **Cyrtusa** Erichson.

kyrtoo ich krümme,

- 1) **subtestacea** Gyllenb. 1579.
gibbula Schüppel in litt. — granaria Erichs. in litt. —
München; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Frankfurt v. Heyden.
- 2) **minuta** Ahrens. 1580.
Augsburg, am ersten Juli 1867 im Spickel; München; Din-
kelsbühl, Pfarrer Wolff; Aschaffenburg s. Seligenstadt, Decan Scr.;
Frankfurt v. Heyden.
- 3) **paucilla** Schmidt. 1581.
Aschaffenburg s. s.; Ober-Lais ein Stück, Decan Scr.; Darm-
stadt n. s., Oberstlieutenant Klingelhöffer.

260. **Colenis** Erichson.

kolen Knie.

- 1) **dentipes** Gyllenb. 1582.
immunda Sturm. (Anisotoma) — aciculata Steph. — sublaevis
Ziegl. in litt. — Augsburg n. s., Spickel im Grase gekötschert, Juli,
August; München; Freising n. s., Wiesenwald, Attachinger Au,
Wald bei Wippenhausen, Weihenstephan Juli, überwintert in Moos;
Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. s.

261. **Agaricophagus** Schmidt.

agarikos Pilz, phago ich esse.

- 1) **cephalotes** Schmidt. 1583.
Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Ober-Lais, Decan Scr.; Frankfurt
Dr. Schmidt.

262. *Liodes* Latreille.

leios glatt.

- 1) **humeralis** Kugellan. 1584.
Larve Chap. et Cand. Mem. Liège. 1813. p. 408. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Fränkische Schweiz; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s. Fasanerie von Baumschwämmen.
- 2) **axillaris** Gyllenb. 1585.
bipustulatus Ahrens. — Augsburg; München; Steigerwald n. s.; Darmstadt Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 3) **glaber** Kugell. 1586.
abdominalis Payk. — Larve Schiödt Nat. Tidsskr. 1863. p. 229. t. 10. f. 7—16. — Augsburg; München; Allgäu, Obergeometer Stark; Fränkische Schweiz; Steigerwald s.; Frankfurt, v. Heyden;
- 4) **serricornis** Gyllenb. 1587.
signatus Waltl. — München; Passau.
- 5) **castaneus** Herbst. 1588.
axillaris Steph. — Larve Perris Mem. Liège 1855. p. 233. t. 5. f. 1—8. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Erlangen; Frankfurt v. Heyden.
- 6) **orbicularis** Kugellan. 1589.
seminalum Sturm. — Augsburg; München; Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner; Ober-Lais einzeln, Decan Scr.

263. *Amphicyllis* Erichs.

amphi auf beiden Seiten, kyllos gebogen, krumm.

- 1) **globus** Fabr. 1590.
ruficollis Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg s., Spickel in Moos, November; München; Freising, Weihenstephan in Moder ein Stück, Juli; Aschaffenburg s. — var. staphylaea Gyllh. — Augsburg s., Leitershofen in Moos, April; Steigerwald s. — var. ferruginea Sturm. — München; Nürnberg; Erlangen.
- 2) **globiformis** Sahlbg. 1591.
Aschaffenburg; Ortenburg, Dr. Bose; Ober-Lais. Decan Scr.; Giessen, Laubenheimer.

264. *Agathidium* Illiger.

agathidion Knäul.

- 1) **nigripenne** Kugellan. 1592.
München; Steigerwald s., an Baumstücken und an alten Baumschwämmen; Ober Lais ein Stück, Decan Scr.
- 2) **atrum** Payk. 1593.
rufipes Steph. — Augsburg s., Spickel, Februar; Allgäu, Ober-

geometer *Stark*; München; Freising n. s., Plantagenwald, Wald bei Thalhausen, Attachinger Au in Moos, November bis April; in Isargenist, April; Steigerwald s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden*.

3) ***seminulum* Linné.** 1594.

Larve Perris Ann. Fr. 1841. p. 44. t. 2. f. 17—25. — Zusmarshausen; Augsburg s., Deuringen in Moos, April; München; Freising, Wald bei Thalhausen in Moos, April; Passau; Nürnberg s.; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Seligenstadt und Ober-Lais, Decan *Scr.*

4) ***laevigatum* Erichs.** 1595.

orbiculare Steph. — Augsburg n. s., Leitershofen, Spickel, Wulfertshausen in Moos, November bis April; Freising n. s., Wiesenwald April, Plantagenwald Oktober in Moos, in Isargenist, März, April; Aschaffenburg s.

5) ***badium* Erichs.** 1596.

Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden*.

6) ***mandibulare* Sturm.** 1597.

Larve Schiödt Nat. Tidsskr. 1863. p. 229. t. 10. f. 17—20. — München; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Freising, Wald bei Thalhausen in Moos, April.

7) ***rotundatum* Gyllh.** 1598.

lycogalae Hardy. — Augsburg; Allgäu, Obergeometer; *Stark*; auf dem hohen Rothskopfe im Vogelsberg ein Stück Decan *Scr.*

8) ***varians* Beck.** 1599.

Zusmarshausen; Ober-Lais in Mehrzahl unter einem morschen Balken von Eichenholz, Decan *Scr.*

9) ***nigrinum* Sturm.** 1600.

München; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt v. *Heyden*; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

10) ***marginatum* Sturm.** 1601.

orbiculatum Gyllh. — pumilum Hardy. — Augsburg; München; Aschaffenburg s.

11) ***discoideum* Erichs.** 1602.

Steigerwald s.

C. Clambidae.

265. *Clambus* Fischer.

Klambos, verstümmelt, sehr klein.

1) ***pubescens* Redtenb.** 1603.

Augsburg s., Wulfertshausen, Mai; Freising s.; Aschaffenburg s. s.; Friedberg, Hauptmann Fuhr.

2) *minutus* Sturm. 1604

nigriclavus Steph. — armadillus Redtenb. — Augsburg am Lechufer unter Steinen in Sand. *Schweiger*; Freising s. in Isargenist, März; Hexenagger bei Regensburg, Dr. v. *Weidenbach*; Ober-Lais einzeln Decan *Scr.*

3) *punctulum* Beck. 1605.

Zusmarshausen; Augsburg s.; Freising h. in Isargenist, März, April und September; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Nürnberg s.; Hessen s. s., Decan *Scr.*

4) *armadillo* De Geer. 1606.

punctulum Gyllh. — convexus Marsh. — atomarius Sturm. (Agathidium). — Augsburg s.; München; Freising n. h. im Walde bei Wippenhausen, April; Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt n. s., v. *Heyden.*; Ortenberg Dr. *Bose.*

266. *Calyptomerus* Redtenb.

kalyptos verborgen, meros Glied.

Camozus Fairm.1) *dubius* Marsh. 1607.

cephalotes Dej. — enshamensis Steph. — Larve Peris. Ann. Fr. 1852. p. 574. t. 14. f. 1—10. — Ortenberg in Mehrzahl, Dr. *Bose.*

D. Sphaeridiidae.267. *Sphaerius* Walll.

sphaira Kugel.

1) *acuroides* Walll. 1608.

obsidianus Kolen. — München; Passau, Professor Dr. *Walll.*; Aschbach n. s. an alten Stöcken; Aschaffenburg in Menge am Rande eines moorigen Wiesengrabens unter Stockstadt; Seligenstadt, auf schlammigen Boden, Decan *Scr.*; Ortenberg, Dr. *Bose.*

In Baiern finden sich 117 Arten und 8 Varietäten; 460 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XI. TRICHOPTERYGIDAE.

268. *Ptenidium* Erichson.

ptenos geflügelt.

1) *apicale* Gillm. 1609.

Augsburg n. s., Leitershofen in Moos, November; München; Nürnberg.

- 2) **formicetorum** Kraatz. 1610.
 Freising einige Stücke aus einem Neste der *Formica rufa* im Walde bei Wippenhausen, Ende März; Seligenstadt in den Seligenstadt in der Colonien der *Formica fuliginosa* in Mehrzahl Decan *Scr.*; Frankfurt v. *Heyden*.
- 3) **fusicorne** Erichs. 1811.
 picipes Matth. — obscuricorne Motsch. — aquaticum Motsch. in litt. — apicale var. Halid. — Freising s., Attachinger Au ein Stück; Frankfurt zwei Stücke, Oberlieutenant v. *Heyden*.
- 4) **laevigatum** Gyllm. 1612.
 punctulum Steph. — Augsburg s., Wulfertshausen, Mai; Freising s., Wald bei Thalhausen, April; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Wis-selsheim und Giessen, Senator v. *Heyden*.; Ober-Lais, einzeln, in den Nestern der *Formica fuliginosa*, Decan *Scr.*
- 5) **pusillum** Gyll. 1613.
 nitidum Heer. quadrifoveolatum Allib. — minutissimum Steph. — evanescens Spence in litt. — apicale Sturm. in litt. — Augsburg s. h., Spickel, Wulfertshausen, November bis April in Moos; München; Freising g., Wald bei Thalhausen unter Eichenrinde, April, Wald bei Wippenhausen, November, Attachinger Au, den Winter über in Moos, Weihestephan von Bäumen geklopft, Juni. Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg h.; Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg n. h.
- 6) **Gressneri** Gyllm. 1614.
 Ober-Lais in einer Colonie der *Formica fuliginosa* in Mehrzahl, Decan *Scr.*

269. **Nossidium** Erichs.

nossis ein kleiner Vogel, eides ähnlich.

- 1) **pitosellum** Marsh. 1615.
 brunneum Marsh. — nitidulum Marsh. — Ferrarii Redtenb. — Freising, ein Stück bei Weihestephan in Moder, April, ein zweites Juli.

270. **Ptilium** Erichson.

ptilon Wolle.

- 1) **Kunzei** Heer. 1616.
 longicorne Mannerh. — nanum Steph. — München; Passau; Regensburg s. h. in Koth, im Spätsommer auch in Pilzen; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais unter faulenden Vegetabilien in grosser Anzahl, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden*.
- 2) **angustatum** Erichs. 1617.
 Spencei Allib. — depressum Motsch. — oblongum Gyllm. —

Passau; Regensburg; Nürnberg s.; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*; Frankfurt und Ems v. *Heyden*.

- 3) **fusipenne** Först. 1618.
Erlangen.
- 4) **fuscum** Erichs. 1619.
rugulosum Allib. — München, Dr. *Wall*.
- 5) **minutissimum** Web. et Mohr. 1620.
exavatam Halid. — trisulcatum Aubé. — laesicolle Walt
in litt. — Augsburg, unter Ameisen; Passau; Nürnberg s.; Frank-
furt unter *Formica rufa*, Senator v. *Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose*.
- 6) **canaliculatum** Erichs. 1621.
exaratum Allib. — angustatum Motsch. — minutissimum Heer.
— Regensburg; Aschaffenburg n. s.; Enkheim, am Torfstich, v.
Heyden; Ortenberg, Dr. *Bose*.
- 7) **caesum** Erichs. 1622.
latum Gillm. — Passau, Dr. *Wall*; Regensburg am Donauufer in
Koth und beim Abschöpfen des Grases an derselben Stelle nur
einige Mal gefangen.
- 8) **inquinum** Erichs. 1623.
myrmecophilum Allib. — haemorrhoidale Motsch. (Oligus.)
— formicarium Motsch. in litt. — canaliculatum var. Märkel. —
Augsburg n. s., am 20. April 1867 zwanzig Stück aus einem
Neste der *Formica rufa* von Kissing; Seligenstadt und Ober-Lais
einzeln, Decan *Scr.*
- 9) **discoideum** Gillm. 1624.
Regensburg einmal mit canaliculatum unter feuchtem Laube
gefangen.

269. *Ptinella* Mattheos.

- 1) **aptera** Guér. 1625.
Larve Perris, Ann. Fr. 1853. p. 586 t. 18. f. 60—68. — Frank-
furt, Dr. *Schmidt* und v. *Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose*; Ober-
Lais in Mehrzahl unter Rinden, Decan *Scr.*
- 2) **tenella** Erichs. 1626.
microscopia Gillm. — Ziemlich häufig bei Regensburg und
Passau.
- 3) **angustula** Gillm. 1627.
Regensburg, einmal gefunden; Heidelberg in Eichenmulm,
Senator v. *Heyden*.
- 4) **testaceu** Heer. 1628.
truncorum Motsch. in litt. — Larve Gillm. Mon. p. 28. t. 320.
f. 13—16. — Odenwald, Senator v. *Heyden*; Seligenstadt einzeln,
Ober-Lais unter fauler Kieferrinde in grosser Anzahl, Decan *Scr.*
Freising in grosser Anzahl unter Rinde von *Populus*, bei *Formica*

nigra, Pförer Au, den 9. April 1871; Regensburg; Kelheim; am Michelsberg, *Gillmeister*; Frankfurt, Cronthal im Taunus, Senator *v. Heyden*. — var. *limbata* Heer. — Regensburg; Ober-Lais, Decan *Scr.*

5) ***ratibonensis* Gyllm.** 1629.

testacea var. *Erichs.* — Regensburg einmal gefunden; Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*

laescollis Waltl in litt. Passau, Dr. *Waltl.*

272. ***Pteryx* Matthews.**

pteryx Flügel.

1) ***suturalis* Heer.** 1630.

bicolor Motsch. — flavescens Motsch. in litt. — fusca Motsch. in litt. mutabilis Matth. — flavicornis Mäkl. — corticalis Schüppel in litt. — Augsburg n. s., Leitershofen in Moos, November; Freising n. s.; Wald bei Thalhausen unter Rinde, April, Attachinger Au, Wald bei Wippenhausen und Wiesenwald unter Rinden, April bis Juli; Regensburg h. unter Buchen und Kiefernrinde auch unter Formica *cunicularia*, *Gillmeister*; Odenwald *Wider*; Frankfurt, *v. Heyden*; Seligenstadt und Ober-Lais unter Rinden, Decan *Scr.*

273. ***Trichopteryx* Kirby.**

thrix Haar, pteryx. Flügel.

1) ***atomaria* De Geer.** 1631.

flavicornis Waltl. — quadrata Motsch. — fuscipennis Motsch. in litt. — picipennis Gillm. in litt. — pubescens Schüppel in litt. — cassidoidea Schüppel in litt. — minutissima Marsh. — minima Marsh. — caucasica Kolenat. — Augsburg; München; in Isargenist unterhalb der Bogenhauser Brücke, Mai im englischen Garten, April, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Attachinger Au in Dung, fliegt besonders Abends; in Isargenist, März; Passau; Regensburg; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg h.

2) ***grandicollis* Mannerh.** 1632.

fascicularis Gillm. — Augsburg h., Spickel, Leitershofen, das ganze Jahr hindurch, im Sommer in Dung, im Winter in Moos, Rosenauberg in Weidenmoder; München; Freising s. h., Marzlinger Wiesen, April, Wiesenwald, Attachinger Au, Wald bei Wippenhausen, Weihestephan, von Bäumen geklopft, Juni, Isarufer in Dung; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg n. s.

3) ***fuscicularis* Herbst.** 1633.

intermedia Gillm. — München; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; Ober-Lais in den Colonien der Formica fuliginosa, Decan *Scr.*

4) ***thoracica* Waltl.** 1632.

melanaria Allib. — Augsburg, Leitershofen in Moos, drei Stück, April; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt zwei Stück, Senator *v. Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

5) *brevipennis* Erichs. 1635.

clavipes Gillm. — picicornis Mannerh. — Augsburg n. s., Spickel in Moos, November; Freising h., Wald bei Marzling, April; in Isargenist in Menge, September; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Regensburg, unter feuchten Laub; Nürnberg; h. Hummelstein, August; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Ober-Lais in Colonien der *Formica fuliginosa*, Decan Scr.

6) *pygmaea* Er. 1636.

Chevolati Allib. — agilis Motsch. in litt. — parallelogramma Gillm. — Freising ein Stück im Hühnerstalle der Wirtschaft von Reusch, Juni.

7) *pumila* Erichs. 1637.

sericans Gillmeister. — Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Frankfurt, Senator v. Heyden.

8) *sericans* Heer. 1638.

depressa Gillm. — Augsburg s., Spickel in Moos, November; Freising, in Isargenist, April, Isarufer in Dung, Juni; Regensburg in Koth, bisweilen unter Pappel- und Kiefernrinde; Nürnberg; Aschaffenburg s.

Die Ptilien leben in faulenden Pflanzenstoffen, unter Baumrinden, in Dung und in Ameisennestern. Wenn sie in kleinen Gläsern gesammelt, und durch Erwärmen derselben getödtet werden, bleiben ihre Hinterflügel entfaltet, dieselben sind mit äusserst feinen Fransen besetzt.

In Baiern finden sich 30 Arten und 1 Varietät, 128 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XII. SCAPHIDIDAE.

271. *Scaphidium* Olivier.

skaphidion kleiner Kahn.

1) *quadrinaculatum* Oliv. 1639.

Zusmarshausen; Augsburg n. h., Leitershofen in Baumschwämmen; München, in der Au an einem Baumschwamme, Mai, Dr. Kr.; Freising s.; Passau; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald ziemlich s. auf Schwämmen; Aschaffenburg n. h.; Babenhausen, in Mehrzahl in Schwämmen und im Schimmel, der sich an faulenden auf der Erde liegenden Aesten erzeugt, Decan Scr.; Frankfurt v. Heyden; am 18. Juli 1875 ein ♀ an Baumschwämmen; Schloss Altenburg bei Alsfeld in Oberhessen, v. Heyden.

275. *Scaphium* Kirby.

skaphion Schiff, Kahn, Grabscheit.

- 1)
- immaculatum*
- Oliv. 1640.

Aschaffenburg s., einige Exemplare auf *Sparassis crispa* Fr. im Schmerlenbacher Walde; Offenbach in grosser Anzahl, Frankfurt und Mainz, v. Heyden, nur in Nadelwäldern; Darmstadt Oberstlieutenant Klingelhöffer.

276. *Scaphiosoma* Leach.

skaphe Kahn, soma Leib.

- 1)
- agaricinum*
- Oliv. 1641.

pulcarium Rossi. — Zusmarshausen; Angsburg s. h., im Herbste in Baumschwämmen, im Frühjahr und Winter in Moos; München, bei Thalkirchen, Juni, Dr. Kr.; Freising s. h. Wald bei Wippenhausen, Isarufer; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Nürnberg h.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h. an Schwämmen und unter Baumrinden; Aschaffenburg h.

- 2)
- boleti*
- Panz. 1642.

München; Bockenheim bei Frankfurt, v. Heyden und Dr. M. Schmidt; Wimpfen, Decan Scr.

- 3)
- assimile*
- Erichs. 1643.

München; Seligenstadt in Anspüllicht des Mains, Decan Scr.; Frankfurt, Senator v. Heyden; Darmstadt Dr. Nebel.

- 4)
- umbatum*
- Erichs. 1644.

Ortenberg, Dr. Bose; Ober-Lais s. s., Decan Scr.

In Baiern finden sich 6 Arten, 51 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XIII. HISTERIDAE.

277. *Hololepta* Paykull.

holos ganz, leptos flach.

- 1)
- plana*
- Fuessly. 1645.

München.

278. *Platysoma* Leach.

platys breit, soma Leib.

- 1)
- frontale*
- Payk. 1646.

puncticolle Redtenb. — Angsburg s., Leiter shofen in Baumschwämmen, Mai; München; Freising, Pförrer Au in Pappelmoder April, Isarufer in Weidenmoder, September; Regensburg n. g.; Nürnberg; unter Eichenrinde am Regensburger Hof, September; Steigerwald n. s. unter Baumrinden; Erlangen; Aschaffenburg s.

2) **depressum** Fabr. 1617.

Larve Schiödt Nat. Tidsskr. 1864. p. 52. t. 2. f. 2—5. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Leitershofen unter Eichenrinde, Mai bis Oktober; München, bei Pullach in Stöcken, August, bei Planeck, Mai bei Grünwald, Mai, bei Ebenhausen, Juli, Lohberg bei Tegernsee, Juni, Dr. Kr.; Immenstadt, Obergemeter Stark; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald n. s. s.; Aschaffenburg h.

3) **oblongum** Fabr. 1648.

elongatum Oliv. — georgianum Leach. — Zusmarshausen, Augsburg; München; zwischen Bruck und Maisach in Stöcken, Juli, Dr. Kr.; Freising s.; Moosburg, Notar v. Sonn; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner; Frankfurt v. Heyden.

4) **lineare** Erichs. 1649.

angustatum Payk. — oblongum Illig. — Pini Solier. — Zusmarshausen; Augsburg; München.

5) **angustatum** Hoffmann Ent. Heft. 1650.

Augsburg; München; Seligenstadt, Decan Scr.; Frankfurt, v. Heyden; Ortenberg Dr. Bose; Ems, Oberstlieutenant Klingelhöffer.

6) **filiforme** Erichs. 1951.

Dalmatinum Küster. — Aschaffenburg Professor Dr. Döbner.

279 **Hister** Linné.

Histrion ein Schauspieler, der einen kurzen Rock trug,
daher Stutzkäfer.

1) **quadrinotatus** Linné. 1652.

Innatus Fabr. — Marshami Steph. — reniformis Oliv. — sinuatus Thanbg. — Augsburg, Professor Petry; München; Freising; Moosburg Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg s. Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen; Fichtelgebirg, Steigerwald g.; Aschaffenburg s. h. Striet, Fasanerie. — var. lunatus Fabr. — München.

Der Käfer stellt nach Erichson und Kiesenwetter den Aphodien in den Dunghaufen nach und frisst sie.

2) **helluo** Truqui. 1653.

modestus Redtenb. — Silesiacus Roger.; — nigerrimus Dej. — Moosburg, Notar v. Sonn.; Hofheim im Taunus auf Erlen, wo er die Larven von Agelastica Alni auffrass, Senator v. Heyden.

3) **unitor** Linné. 1654.

Larve Schiödt Nat. Tidsskr. 1864. p. 152. f. 1 f. — 26. — Zusmarshausen; Augsburg; München; bei der Georgenschwaige in halbtrockenem Kuhdung, Juni, am Ufer des Inn, Heubach gegen-

über, September, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.

4) ***cadaverinus* Hoffm.** Ent. Heft. 1655.

impressus Fabr. — *transversalis* Duft. — *brunneus* Illig. — *striola* Sahlbg. — Kirbyi Steph. — Larve Latr. Nouv. dict. hist. nat. X. 1817. p. 429. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s. an Aas; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald ziemlich s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s. h.

5) ***terricola* Germ.** 1656.

tristriatus Ziegler. — München; Regensburg s.; Nürnberg s.; Langsdorf im Odenwalde, Lehrer *Bach*; Ortenberg, unter faulenden Gemüse im ersten Frühjahr, Dr. *Bose*; Ober-Lais an Aas, Decan *Scr.*

6) ***merdarius* Hoffm.** Ent. Heft. 1657.

memnonius Say. — Augsburg n. h.; München; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg h.

7) ***ametarius* Herbst.** 1658.

sinnatus Fabr. — *bipustulatus* Oliv. — *Illigeri* Duft. — Augsburg h.; München, Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald g.; Aschaffenburg s.

8) ***neglectus* Germ.** 1659.

Leachi Steph. — *quisquilius* Steph. — München; Passau; Regensburg s.; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg s.

9) ***carbonarius* Illig.** 1660.

duodecimstriatus Fabr. — *nigellatus* Germar. — Augsburg; München, bei Nymphenburg, Juni, bei Planeck, Mai, Dr. *Kr.*; Freising, in Isargenist, April; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg s.; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. h.; Frankfurt 2 Stück *v. Marseul* als *nigellatus* Germ. bestimmt, *v. Heyden*.

10) ***ventralis* Marsh.** 1661.

Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, *v. Heyden*.

11) ***rusticornis* Grimm.** 1662.

myrmocephilus Muls. — *nigellatus* Marsh. — Aschaffenburg, Seligenstadt und Enkheim in den Colonien der *Formica fuliginosa* n. s., Decan *Scr.*

(Fortsetzung folgt)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).