

Hr. Dr. G. Entz beschreibt die Rhizopoden aus den Salz-
teichen von Szamorfalva in Siebenbürgen, und bemerkt hiebei,
dass ein Theil der Rhizopoden in grossen Massen in abgestandenem
Wasser, in welchem Pflanzentheile langsam verwesen, leben, da-
her zur Aufzucht solcher Thiere ein Wasser dient, welches Monate
lang schon in einem Gefäss aufbewahrt steht, und in welchem
Excremente von Räderthieren, kleinen Crustaceen, Insectenlarven,
Algen u. s. w. vorfindlich. Neue Arten sind *Pleurophrys helix*,
Plectophris prolifera, in die Nähe von *Plagiophris* und *Pleuro-*
phrys zu stellen und bei *Clamydophris stercoracea* einzureihen,
Englyphia pusilla, *Microcometes tristrypatus*, der *Mic. palu-*
dosa sehr nahestehend, *Orbulinella smaragdea*, deren Schale
der durchlöcherten Seeforaminifere ähnelt, namentlich der *Orbulina*
universa und als Repräsentant einer eigenen Gruppe der Familie
der Orbuliniden am nächsten aufzustellen sei.

Graf J. v. Pejacsevich gibt Mittheilung über die s. g.
Vogelnester von Herrengrund, welche Pisolithe sind, einzeln,
lose untereinander in einer muldenartigen Höhlung aufgehäuft,
welche durch das von der Decke herabtröpfelnde kalkhaltige
Wasser gebildet wird.

Hr. Alex. Schmidt beschreibt den Cerussit von Schemnitz.

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

C. Cercus Latreille.

- 4) *rubiginosus* Erichs. 1729.
Spireae Märkel. — rhenanus Bach in litt. — Augsburg, Wul-
fertshausen, im Frühjahr von Gebüsch geklopft, *Schweiger*;
Freising, Plantagenwald in Moos, November; Aschaffenburg s.;
Ober-Lais und Wimpfen einzeln, Decan *Scr.*; Ortenberg, Dr. *Bose*;
Bingen v. *Heyden*.
- 5) *dalmatinus* Er. 1730.
Frankfurt einmal v. *Heyden*.
- 6) *ruflabris* Latr. 1731.
Caricis Steph. — fulvus Erichs. — rubicundus Heer. — testaceus
Casteln. — München; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt, Decan
Scr.; Ortenberg Dr. *Bose*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

295. *Brachypterus* Kugelann.

brachys kurz, pteron Flügel.

A. *Brachypterus*. Kugelann.1) *gravidus* Illig. 1732.

atratus Dej. — agaricinus Herbst — scutellatus Kugel. — pulicarius Gyllh. — leptaroides Scopol. — *Linariae* Steph. — Larve Kaltenbach Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinlde. XIX. p. 84 — Augsburg; München, am Wege nach der Georgenschweige gestreift, Juni, im Garten von Nymphenburg, Juni, bei Bogenhausen auf Gesträuchen, Juli, Tegernsee Mai, Dr. Kr., Freising n. h.; Moosburg, Notar v. Sonn.; Regensburg g.; Nürnberg h. Dutzendeich, September, auf Blüten von Galium Mollugo und Spiraea ulmaria, Sturm; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s., Frankfurt, v. Heyden.

Er findet sich häufig auf *Linaria vulgaris*. Im Juni legt er Eier zwischen den Gipfelblättern und den Blütenknospen. Die Larven nähren sich von den Fruktificationsorganen, benagen die Innenseite der Blumen und bohren sich schon frühzeitig in die jungen Kapseln, wo sie die weichen Samenkörner verzehren. Zur Verwandlung gehen sie in die Erde, im September ist das Insekt entwickelt. (Lehrer Cornelius.)

2) *Linariae* Cornelius. 1733.

Larve Stet. Zeit. 1863. — Ober-Lais und Wimpfen, Decan Scr. Frankfurt, v. Heyden.

3) *cinereus* Heer. 1734.

pulicarius Latr. — München; Regensburg g.; Erlangen; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg s.

B. *Heterostomus* Duval.

heteros anders, stoma Mund.

4) *fulvipes* Erichs. 1735.

Seligenstadt einige Exemplare, Decan Scr.; Hildesheim H. Wilken.

5) *pubescens* Erichs. 1736.

glaber Newm. — Augsburg n. s.; Nürnberg; Aschaffenburg n. s., Frankfurt v. Heyden.

6) *Urticae* Fabr. 1737.

abbreviatus Herbst. — scutellatus Panz. — pussilus Melsh. — erythropus Steph. — *Urticae* var. b. Illig. — Augsburg n. s., Siebentisch an *Urtica dioica*; München; an den Blütenknospen der *Urtica dioica* sehr zahlreich, Juli, Dr. Kr.; Freising; Weihestephan in Moder, Juli; Moosburg, Notar v. Sonn.; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald g. in Wäldern auf *Urtica dioica*; Aschaffenburg s. h.; Frankfurt, v. Heyden.

B. *Carpophilini*.296. *Carpophilus* Stephens.

karpos Frucht, phileo ich liebe.

1) *hemipterus* Linné. 1738.cadaverinus Fabr. — filus Fabr. — flexuosus Payk. — quadriguttatus Thunbg. — bimaculatus Oliv. — Melsh. — München; Odenwald an Arzneiwaaren, *Wider*.2) *bipustulatus* Heer. 1739.oculatus Géné in litt. — bipustulatus var. Stein. — München; Freising, Attachinger Au in Moos, ein Stück, April; Odenwald an Arzneiwaaren, *Wider*; Aschaffenburg s.3) *sexpustulatus* Fabr. 1740.abbreviatus Panz. — biguttatus Sturm. Larve Perris Ann. Fr. 1853. p. 593. t. 18. f. 69—75. — Augsburg; München; Nürnberg s., Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einige Stücke unter Baumrinden, Decan *Scr*.C. *Nitidulini*.297. *Epurea* Erichson.

epi oben, ura Schweif.

1) *decemguttata* Fabr. 1741.Augsburg n. h.; München; Nürnberg n. h.; an Eichen- und Buchenstämmen, Saft leckend; Erlangen; Aschaffenburg s., besonders an ausschwitzendem Eichensaft; Frankfurt, *v. Heyden*.2) *silacea* Herbst. 1742.Augsburg; München; Frankfurt, *v. Heyden*.3) *aestiva* Linné. 1743.depressa Gyllh. — ochracea Sturm. — obsoleta Herbst. — villosa Steph. — Augsburg h., Pfersee am Wertachufer auf Blüten, Deuringen, er überwintert in Moos; München, am linken Isarufer oberhalb der Bogenhauser Brücke, Juni, bei Harlaching von Bäumen geschüttelt, Juni, bei Pullach, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihestephan, Mai, Juli, Attachinger Au, Juli, Wald bei Wippenhausen, von Bäumen geklopft, Juni, Isarufer, September, in Isargenist, April; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Burghausen und Hohenschwangau auf Blüten, *Schrank*; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg h.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Bamberg, Professor *Hoffm.*; Würzburg; Aschaffenburg n. s., auf Blüten, besonders auf Brassica Napus; Frankfurt *v. Heyden*. — var. bisignata Sturm. — Freising s. Weihestephan, Juli; Nürnberg; Erlangen, Prof. Dr. *Rosenhauer*.4) *melina* Sturm. 1744.

depressa Illig. — Augsburg n. h. Lechhausen, Mai, Lechfeld bei Mering am 20ten Juni 1867; Freising s., Weihestephan von Bäumen geklopft, Mai Juli; Nürnberg; s., Aschaffenburg s., auf Blüten.

- 5) *deleta* Sturm. 1745.
silacea Heer. — Augsburg.
- 6) *immunda* Sturm. 1746.
Augsburg; München; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*.
- 7) *variegata* Herbst. 1747.
Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Steigerwald h.;
Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr*.
- 8) *castanea* Duft. 1748.
Allgäu, Obergeometer *Stark*; Aschaffenburg ein Stück Prof.
Dr. *Döbner*, Frankfurt, v. *Heyden*.
- 9) *neglecta* Heer. 1749.
Augsburg; Aschaffenburg s., an ausschwitzendem Eichensaft;
Frankfurt v. *Heyden*.
- 10) *obsoleta* Fabr. 1750.
oblonga Steph. — Larve Perris Ann. Fr. 1862. p. 184. t. 8.
f. 525.—533 — Zusmarshausen; Augsburg n. h., auf Blüten;
München; Freising, n. h. Weihenstephan Mai; Wald bei Thal-
hausen, Mai; Regensburg g.; Nürnberg n. h.; Erlangen; Steiger-
wald h., Aschaffenburg h., besonders an ausschwitzendem Eichen-
saft. — var. *biguttata* Thunbg. — München.
- 11) *parvula* Sturm. 1751.
rufomarginata Steph. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; Aschaf-
fenburg s. s.; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenberg, Dr. *Bose*; Frank-
furt, v. *Heyden*.
- 12) *borulla* Zetterst. 1752.
Allgäu, Obergeometer *Stark*; München.
- 13) *pygmaea* Gyllh. 1753.
Augsburg n. h.; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München;
Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt, einige Stücke, Decan *Scr*.
- 14) *pusilla* Illig. 1754.
Augsburg n. h.; München; Freising, Marzlinger Wiesen unter
Tannenrinde, April, Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Mai;
Aschaffenburg n. h.; Frankfurt, v. *Heiden*.

(Fortsetzung folgt)

 Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer**.

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).