

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung

vorkommen. (Fortsetzung.)

- 15) *oblonga* Herbst. 1755.

Augsburg n. h.; München, Freising; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Nürnberg n. h.; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt Dr. *Nebel*; Frankfurt, Lanterbach, v. *Heyden*.

- 16) *longula* Erichs. 1756.

Augsburg; Aschaffenburg s., auf Blüthen; Ober-Lais Decan *Scr.*

- 17) *florea* Erichs. 1757.

aestiva Illig. — Augsburg n. h.; München; Freising s., Weihenstephan, Mai bis Juli; Aschaffenburg n. s., an ausfliessendem Safte und auf Blüthen.

A. *Micruria* Reitter.

- 18) *melanocephala* Marsh. 1758.

discolor Waitl. — ferruginea Heer. — truncata Steph. — Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; auf dem hohen Vogelsberg in Mehrzahl gekötschert, Decan *Scr.*

B. *Omosiphora* Reitter.

- 19) *limbata* Fabr. 1759.

Augsburg n. s., am Wertachufer bei Pfersee unter Steinen; München; Freising n. s., Isarufer in Weidenmoder, September, Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.

298. *Nitidula* Fabricius.

Nitere glänzen.

- 1) *bipustulata* Linné. 1760.

bipunctata Fourcr. — scaraboides Scopel. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Nürnberg n. s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. h.: Odenwald, *Wider*; Aschaffenburg s.; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

Der Käfer findet sich an todtten Thieren, Fettwaaren, wo er schädlich ist, und Blumen. Die Larve soll in Bovisten leben.

- 2) *flexuosa* Fabr. 1761.

flavomaculata Rossi. — München.

3) *rufipes* Linné. 1762.

obscura Fabr. — fulvipes Fourcr. — Zusmarshausen; Augsburg, München, Tegernsee, *Schränk*; Passau; Erlangen; Steigerwald h.; Aschaffenburg oft h.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr*.

4) *quadripustulata* Fabr. 1763.

guttalis Herbst. — carnaria Schaller. — Augsburg; München; Passau; Erlangen; Aschaffenburg s.

299. *Soronia* Erichson.

soronis alte Eiche.

1) *punctatissima* Illig. 1764.

München; Dinkelsbühl, einmal s. h. bei der Raupe von *Cosus ligniperda*, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Erlangen; Aschaffenburg s. s., Rauenthal; Seligenstadt und Darmstadt an ausfließendem Eichensaft s., Decan *Scr*.

2) *grisea* Linné. 1765.

varia Fabr. — variegata Oliv. — ferruginea Scopol. — Larve Curtis Trans. Linn. Soc. I. p. 87, t. 5. f. 6—11. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 163. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., am Wertacher bei Pfersee; Mai; München, bei Ebenhausen, Juni, Dr. *Kr*.; Freising n. s. in Moos, April; Moosburg, Notar *v. Sonn*.; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. h., unter Baumrinde bei kranken nassen Stellen der Bäume.

Die sechsbeinige deprimierte Larve hat jederseits hinter den Kinnbacken nur drei Nebenaugen, zwölf Leibesringe mit braunen Haarflecken in Querreihen auf dem Rücken, und mit kurzen seitlichen Anhängen versehen, der letzte besitzt zwei aufwärts gebogene Hörnchen.

300. *Amphotis* Erichson.

amphotis beiderseits gehört.

1) *marginata* Fabr. 1766.

biloba Herbst. — Augsburg n. h., Leitershofen Juli; München; Freising n. h., Wald bei Wippenhausen gekötschert, Juli; Moosburg, Notar *v. Sonn*.; Regensburg s. s.; Nürnberg n. h.; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. s., bei *Formica fuliginosa*.

(Fortsetzung folgt)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).