

**Systematische Uebersicht der Käfer,**  
welche in Baiern und der nächsten Umgebung  
vorkommen. (Fortsetzung.)

**C. Hybalini.**

409. **Ochodaeus** Serville.

ochos tragend, odus Zahn.

1) **chrysomelinus** Fabr.

2231.

chrysomeloides Schrank. — indianus Reiche in litt. — Ingolstadt, *Schrank*; Aschaffenburg, Prof. *Oechsner*; Offenbach und Frankfurt, in der Dämmerung fliegend, Senator von *Heyden*.

**D. Geotrupini.**

410. **Bolboceras** Kerby.

bolbos Knollen, Zwiebel, keras Horn.

1) **unicornis** Schrank.

2232.

quadridens Fabr. — Aeneas Panz. — Aschaffenburg, 1830 am Rande des Strietwaldes in vielen Exemplaren, Dr. *Hoffmann*.

411. **Odontaeus** Klug.

1) **mobilicornis** Fabr.

2233.

♀ bicolor Fabr. — armiger Hochenw. — Zusmarshausen; Augsburg, auf Feldern, welche mit Schafmist gedüngt waren, Abends im Fluge gefangen, Prof. *Petry*, Spickel, Leitershofen, Lechfeld bei Mainz, immer Abends gestreift, *Schweiger*; München; Moosburg, Notar v. *Sonn*.; Passau; Regensburg s. s.; Fränkische Schweiz; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschbach, im Schlossgarten, ein Weibchen im Fluge gefangen 1844, nur die rothe Varietät; Erlangen; Burgberg, Pfarrer *Hackel*; Aschaffenburg s. s.; Glattbach, Fasanerie; Frankfurt, Senator v. *Heyden*; Oderuheim, Decan *Scr*.; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*; Ortenberg, Dr. *Bose*.

412. **Geotrupes** Latreille.

ge Ende, trypaos ich durchbohre.

Geotrypes Latreille.

**A. Minotaurus** Mulsant.

Ceratophyus Fischer.

1) **Typhoeus** Linné.

2234.

vulgaris Leach. — München; Moosburg, Notar v. *Sonn*.; Re-

gensburg s. s.; Kehlheim, in Schafdung, *Schrank*; Erlangen; Bayreuth, *Richter*; Aschaffenburg n. s., besonders in Schafmist; Hanau; Seligenstadt; Frankfurt; Darmstadt: Büdingen; Decan *Scr.*

### B. *Geotrupes Mulsant.*

2) *stercorarius* Linné. 2235.

putridarius Erichs. — Larve Muls. Col. Fr. Lamell. p. 345. — Ueberall h. in Dung, fliegt Abends, und wird als Verkünder schönen Wetters betrachtet. Bei München kommen auf ein Männchen des *stercorarius* 2 *foveatus* und 4 *spiniger*, Major von *Harold*.

3) *spiniger* Marsh. 2236.

mesoleius Thoms. — puncticollis Malinowsk. — sublaevigatus Steph. — *stercorarius* Erichs. — München; Neufahrn, eine ausgezeichnete und durch den Autor (Scand. Col. X. 1868. p. 331) vom ächten *stercorarius* Linné durch vorzügliche Merkmale wohl unterschiedene Art, welche in Gemeinschaft mit demselben in hiesiger Gegend doch etwas seltener vorkommt, die weitere geographische Verbreitung bleibt noch fest zustellen, Major v. *Harold*; Passau, *Kittel*.

4) *foveatus* Marsh. 2237.

punctato striatus Steph. — *stercorarius* var. minor Erichs. — intermedius Ferrar. — *stercorarius* var. mas Thoms. — putridarius Muls. — Neufahrn, mit den zwei vorigen Arten, Major von *Harold*.

5) *mutator* Marsh. 2238.

affinis Falderm. — politus Malinowsky. — fmicola Megerle in litt. — sylvicola Megerle in litt. — virescens Muls. — *stercorarius* Herbst. — *stercorarius* var. Latr. — Augsburg; München; Freising; Moosburg, Not. v. *Sonn*.

6) *sylvaticus* Panz. 2239.

*stercorarius* Hartm. — Ueberall h., vorzüglich in Wäldern. — var. *monticola* Heer. — München.

(Fortsetzung folgt.)

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Duck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)